

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Bonn.

Direktor: Professor Dr. Martini.

Die
Bedeutung der Diastasebestimmung nach Wohlgemuth
in Harn und Blut für die klinische Diagnostik.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 27. Januar 1937

von

Hermann Hummel

aus Kassel (Hessen-Nassau).

Gedruckt mit Genehmigung
der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Martini.



Meinen Eltern
in Dankbarkeit!

Inhalt.

- I. Literaturbesprechung.
 - II. Die Untersuchungen der Medizinischen Universitätsklinik Bonn.
 - III. Die Bestimmungen der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn.
 - IV. Eigene Bestimmungen.
 - V. Allgemeine Zusammenfassung.
-

1. Literaturbesprechung.

Als Wohlgemuth¹⁾ die Ergebnisse seiner Untersuchungen über das Verhalten des Diastasewertes im Blut und im Harn veröffentlichte, glaubte man, endlich eine Möglichkeit gefunden zu haben, welche die Diagnose von Pankreaserkrankungen wesentlich erleichterte. Denn die Diagnose von Krankheiten der Bauchspeicheldrüse war ja von jeher ein Sorgenkind der Medizin gewesen, weil einmal manche Affektionen des Pankreas äußerst symptomarm verlaufen, und weil weiterhin gar zu leicht evtl. auftretende Symptome auf andere in der Nachbarschaft des Pankreas liegende Organe bezogen werden. Die meisten direkten Untersuchungsmethoden führen nur selten zu einem sicheren Ergebnis, woran auch die Besserung wenig ändert, die seit den eingehenden Darlegungen von Heiberg²⁾ eingetreten ist.

Daher wurde von jeher großer Wert auf die indirekten Methoden gelegt, welche aus dem Funktionsausfall, bzw. dem Nachweis von „entgleiten“ Fermenten im Stuhl, im Harn und im Blut zu einer sicheren Diagnose zu kommen suchten. Obwohl die Wohlgemuth'sche Methode der Diastasebestimmung als bekannt vorausgesetzt werden kann, soll dieselbe noch einmal kurz geschildert werden.

Das Prinzip ist der durch den Diastasegehalt des Urins bedingte Abbau einer dem Harn zugesetzten Stärkelösung. Während die noch unverdaute Stärke mit Jod die typische Blaufärbung gibt, sind die ersten Abbauprodukte, die Dextrine, schon nicht mehr mit Jod färbbar, sie geben höchstens einen rotbräunlichen Farbton.

Als Einheit hat Wohlgemuth die Fermentmenge angenommen, die imstande ist, ein Milligramm Stärke bis zu den mit Jod nicht mehr färbbaren Dextrinen abzubauen.

Die Diastasebestimmung geht im Harn nun folgendermaßen vor sich:

Man benötigt eine 0,1%ige Stärkelösung; sie wird hergestellt, indem man 0,1 g lösliche Stärke (Kahlbaum) in 100 ccm 1%iger Kochsalzlösung auf dem Wasserbade auflöst. Die Lösung muß immer ziemlich frisch sein, sie wird am besten nicht länger als

zwei bis drei Tage aufbewahrt. Dann ist noch eine $n/50$ -Jodjodkalilösung nötig, sowie 1%ige Kochsalzlösung.

Man stellt nun 12 Reagenzröhrchen bereit, die fortlaufend mit den Nummern I bis XII bezeichnet werden. In Röhrchen Nr. 1 füllt man 2 ccm Urin, in die Röhrchen Nr. II bis XII je 1 ccm 1%ige Kochsalzlösung.

Nun werden aus Röhrchen Nr. I 1 ccm Urin in Röhrchen Nr. II überpipettiert — nach dem Mischen pipettiert man aus Röhrchen Nr. II wieder 1 ccm über in Röhrchen Nr. III und fährt so fort bis zum Röhrchen Nr. XII. Von diesem letzten wird nach dem Mischen 1 ccm wieder herausgenommen. In jedem Röhrchen befindet sich also halb so viel Urin, wie in dem in der Reihe vorangehenden — oder anders ausgedrückt: Der Uringehalt in den sich aufeinanderfolgenden Röhrchen Nr. I bis XII bildet eine fallende geometrische Reihe. Nun füllt man rasch in jedes Röhrchen 2 ccm der Stärkelösung und stellt alle Röhrchen in einen Thermostaten, Brutschrank oder auf ein Wasserbad von 38° C. Nach genau einer halben Stunde werden sie herausgenommen. Durch Eintauchen in kaltes Wasser wird der Abbauvorgang unterbrochen, und danach gibt man in jedes Röhrchen 1—2 Tropfen der $n/50$ Jodjodkalilösung.

Ein Teil der Röhrchen wird Blaufärbung zeigen als Beweis, daß hier noch unverdaute Stärke vorhanden ist, ein anderer Teil zeigt keine Färbung. Das erste Röhrchen nun, das durch seine blaue bzw. blaurote Färbung anzeigt, daß nicht alle Stärke zu Dextrinen abgebaut ist, gilt als Grenzröhrchen oder „Limes“. Das ihm in der Reihe vorangehende dient zur Berechnung des Diastasewertes. Hat z. B. Röhrchen Nr. VI Blaufärbung gezeigt, so wird zur Diastasebestimmung das vorangehende Röhrchen Nr. V genommen. In diesem befinden sich infolge der anfangs vorgenommenen Verdünnung $\frac{1}{16}$ ccm Urin. Diese $\frac{1}{16}$ ccm hatten gerade noch die Fähigkeit, 2 ccm Stärkelösung bis zu den nicht mehr färbbaren Dextrinen abzubauen. Dann hat folglich 1 ccm Urin die Kraft, 16mal soviel, also 32 ccm Stärkelösung abzubauen. Der in diesem Falle angenommene Urin hat also die „Diastatische Kraft“ D von 32 E. (Einheiten nach Wohlgemuth). Formelmäßig ausgedrückt,

kann man schreiben: „ $D \frac{38^{\circ} \text{ C}}{30 \text{ min.}} = 32 \text{ E.}$ “

Aus der beigelegten Tabelle Nr. I kann der Diastasewert direkt abgelesen werden.

Die Bestimmung im Blutserum geht in der gleichen Art und Weise vor sich — es wird jedoch statt der 1%igen diesmal physiologische Kochsalzlösung genommen.

Die Nachprüfung und Anwendung der Wohlgemuth'schen Methode seitens vieler Untersucher brachte teils Zustimmung, teils Ablehnung.

Daß natürlich Verbesserungen der Originalmethode versucht wurden, ist klar — und ebenso leuchtet ein, daß man bemüht war, den Grund für die großen Unterschiede im Ergebnis der einzelnen Autoren zu finden.

Somogyi³⁾ konnte nachweisen, daß die Hauptschuld daran die ungleichmäßige Zusammensetzung der Reagenzien hat — vor allem das Schwanken in der Zusammensetzung der Stärkelösungen, selbst wenn dieselben immer von ein und derselben Firma bezogen werden.

Chesley⁴⁾ findet eine Erklärung für die wechselnde Wirksamkeit der Stärke darin, daß ihr Gehalt an α -Amylose oder Amylopektin und β -Amylose oder Amylodextrin großen Schwankungen unterworfen ist. Er empfiehlt, nur reine α -, bzw. reine β -Amylose zu verwenden.

Reid⁵⁾ weist darauf hin, daß die Wirksamkeit der Harn-diastase vom spezifischen Gewicht des Harns und von der Harnmenge abhängig ist. Und zwar soll sie umgekehrt proportional der Menge und direkt proportional dem spezifischen Gewicht sein. Auch der Gehalt an Harnstoff soll einige Bedeutung haben: Reid findet, daß die diastatische Wirksamkeit des Harns parallel dem Gehalt an Harnstoff geht.

Ebenfalls auf den Einfluß der Diurese weist Schaan-ning⁶⁾ hin.

Auch für Noeby⁷⁾ ist die Höhe des spezifischen Gewichtes des Harns und die Diurese von Bedeutung.

Daß die Wasserstoffionenkonzentration größeren Einfluß hat, konnten B a u m a n n ⁸⁾ und S k o o g ⁹⁾ zeigen. Sie arbeiten daher mit Pufferlösungen, kommen aber zu verschiedenen Optimalwerten: Baumann hält eine P_h -Zahl von 6,8 am günstigsten, während Skoog eine P_h -Zahl von 7,2 angibt. Letzterer weist noch auf das Jodbindungsvermögen des Harns als Störungsquelle der Wohlgemuth'schen Methode hin und schlägt vor, nach der Stärkeverdünnung die Untersuchungsflüssigkeit mit verdünnter HCl anzufäuern. Skoog betont jedoch dabei, daß für die praktischen Untersuchungen kaum besondere Pufferlösungen nötig sind, da das Verzetzen des Urins mit 1%iger Kochsalzlösung annähernd dem P_h Optimum entspricht und vollauf genügt.

Auch W o h l g e m u t h ¹⁾ selbst erkennt die Wichtigkeit der Pufferlösungen an und empfiehlt ein Gemisch von Mono- und Dinatriumphosphatlösungen.

T a b e l l e N r. 1.

Röhrchen Nr.						
Diastase-Einheiten pro ccm Urin	I		II		III	
	2		4		8	
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
64	128	256	512	1024	2048	4096

Beim Vergleich der Veröffentlichungen der einzelnen Autoren ergibt sich eine große Schwierigkeit insofern, als keine einheitlichen Normalwerte feststehen und somit ein einheitlicher Vergleichsmaßstab fehlt. Ein Verfasser sieht z. B. einen Wert von 64 E. als obere Norm an, ein anderer wieder den von 128 E. Für diesen gelten 8 E. im Harn als erniedrigt, für jenen erst 4 E. Und daraus erklären sich dann auch so manche unterschiedliche Urteile: Wenn ein Unterfucher 128 E. als obere Grenze und erst 256 E. als erhöht ansieht, dann wird er mehr „normale“ Werte haben, als ein anderer Autor, für den schon 128 E. „erhöht“ sind.

In der Arbeit soll versucht werden, jede Abweichung von dem von Wohlgemuth angegebenen oberen Grenzwert von 64 E., bzw. unteren Grenzwert von 8 E. anzuführen.

v. S t r a f f e r ¹⁰⁾ veröffentlicht Untersuchungen über die Diastase im Blut. Als Mittelwert gibt er 16 E. an, als Höchstwert, der

gerade noch als normal bezeichnet werden kann, 32 E. Die Beobachtungen bei allen möglichen Erkrankungen ergeben normale Werte. Bedeutungsvoll könnte sein, daß im allgemeinen bei tuberkulösen Erkrankungen mehr Werte von 8 als von 16 E. gefunden werden. Auch bei verschiedenen Affektionen von Bauchorganen kommt er zu normalen Werten:

24 Fälle von Ulkus ventr., 8 Fälle von Ulcus duod., einige von Magen-Darm-Karzinom, viele Dyspepsiefälle, selbst Störungen seitens der Nieren und des Gallensystems. Die von den meisten Untersuchern beobachtete Erniedrigung des Diastafewertes im Blute von Kranken mit Diabetes mellitus findet er nur bei 2 von 16 Patienten bestätigt. Bei den erhöhten Werten, die v. Straffer bei anderen Erkrankungen findet, schließt er auf eine Mitbeteiligung des Pankreas: so bei 1 Fall von Cholecystitis mit dem Werte von 128 E., bei 1 Fall von Arteriosklerose und Hochdruck mit 512 E. — hier hält v. Straffer arteriosklerotische bzw. arteriosklerotische Veränderungen im Pankreas für gegeben. Desgleichen glaubt er bei 1 Fall von multiplen Gummata im Abdomen an ein ebenfalls gummös verändertes Pankreas mit entzündlichen oder mit Kompressionsvorgängen. Der Diastafewert ist hier ebenfalls 128 E. Bei einem Rektum-Karzinom mit multiplen Metastasen im Abdomen, die klinisch gut nachweisbar gewesen sein sollen, können seiner Meinung nach ganz gut Metastasen des Pankreas vorliegen, die den Diastafewert von 256 E. erklären. Bei einem Fall von inoperablem Magen-Ca. werden durch die Probelaпарatomie Pankreasmetastasen festgestellt, trotzdem ist hier ein völlig normaler Diastafewert zu finden.

Für v. Straffer weisen alle Werte der Blutdiastase von 32 E. und darüber auf leichte oder schwere Bauchspeicheldrüsenerkrankungen hin. Leider ist die Diastaseerhöhung meistens der einzige Beweis für diese Behauptung. Weder durch Operationsbefunde noch durch Sektionsprotokolle ist eine Bestätigung erbracht für die Annahme von Gummata bzw. von Karzinom-Metastasen in der Bauchspeicheldrüse.

Eindeutig für eine Pankreatitis dürfte allerdings eine Patientin sprechen, die an unbestimmten heftigen Schmerzen im Bauch litt,

eine typische schmerzempfindliche Head'sche Zone im Bereich des 8. Dorsalsegments aufwies, bei der nach Gabe von 150 g Brot deutliche Zuckerauscheidung auftrat und die den Diafastawert von 512 E. hatte.

Für J a n k e r ¹¹⁾ ist jeder positive Ausfall, also jede Erhöhung des Diafastawertes im Harn oder im Blut gleichbedeutend mit einer Pankreasaffektion. Er zieht den Harnwert dem Blutwert entschieden vor. Nur bei Nierenschädigung legt er mehr Gewicht auf den Blutwert, also gerade umgekehrt wie v. Straßler. Seine Ansicht belegt Janker mit einer Reihe von besonders deutlichen Beispielen, erwähnt dabei ausdrücklich, daß auch in jedem anderen Fall, in dem sich eine Erhöhung des Diafastawertes gefunden hat, die Diagnose auf Pankreatitis durch den Organbefund bei der Operation oder der Sektion bestätigt worden ist.

Leider gibt Janker keine Zahlen an, sondern beschränkt sich auf graphische Darstellungen.

Der Anstieg kommt nach Janker zustande

1. durch Resorption des gesamten Pankreassekrets bei Gangverfluß oder bei Abschnürung einzelner Drüsenteile,
2. durch Resorption des Sekrets, das bei Verletzungen, auch operativen, und bei Pankreasnekrose in die Umgebung bzw. in die freie Bauchhöhle abfließt.

Janker glaubt an einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Diafastawertes und der Schwere des Krankheitsbildes: ein Rückgang zur Norm ist ihm ein Zeichen der Heilung oder Besserung, ein erneuter Anstieg ein solches für einen Rückfall. Daher hält er sehr viel von der Diafastabestimmung im Urin nach der Wohlgemuth'schen Methode.

Auch R o l o f f ¹²⁾ findet die Diafastabestimmung im Harn gut für die Pankreasdiagnostik, wenigstens hat er bei Erkrankungen von anderen Bauchorganen keine erhöhten Werte gefunden, auch bei Cholecystitis nicht. Nur in einem Fall von Lebercirrhose und einem unklaren Bauchfall stellt er einen erhöhten Wert fest und führt diesen auf eine Erkrankung des Pankreas zurück. In 16 Fällen von akuter Pankreasnekrose hat Roloff nur in 2 Fällen den Höchstnormalwert von 64 E., sonst immer eine wesentliche Vermehrung.

Und diese beiden Fälle waren aus dem akuten schon in das chronische Stadium eingetreten, wie die Sektion später zeigte. Auch bei den andern 14 Fällen ist die Diagnose durch Operation oder Sektion gesichert. Eine sichere Erhöhung rechnet Roloff erst von 250 E. (abgerundet aus 256 E.) an. Ihm genügt die einfache Feststellung einer Vermehrung der Diastase, einen Zusammenhang zwischen Schwere der Erkrankung und Fermentmenge lehnt er ab, sehr im Gegensatz zu den eben angegebenen Ausführungen Jankers!

Liegen bei akuten Bauchzuständen normale Werte vor, dann ist das für Roloff ein Zeichen, daß die Bauchspeicheldrüse nicht erkrankt ist, wenigstens nicht im Sinne der so sehr gefürchteten akuten Pankreatitis oder der akuten Pankreasnekrose. So wird 30mal bei akuten Erkrankungen der verschiedensten Art der Bauchorgane, bei denen normale Diastasewerte vorliegen, durch die folgende Operation oder Sektion sicher festgestellt, daß tatsächlich keine anatomischen Veränderungen an der Bauchspeicheldrüse vorhanden sind.

Nach Roloff läßt der positive Ausfall der Bestimmung, also die Erhöhung der Harndiastase, mit „größter Wahrscheinlichkeit“ auf akute Pankreaserkrankungen schließen. Doch schließt der negative Ausfall eine chronische Pankreaserkrankung nicht sicher aus. Diagnostischen Wert hat für Roloff die Bestimmung also nur in akuten Fällen.

O e s t e r b e r g ¹³⁾ zieht eine Erhöhung des Diastasewertes im Harn ebenfalls für die Diagnose der akuten Pankreatitis und für andere Bauchspeicheldrüsenerkrankungen heran. Wenn bei Erkrankungen anderer Bauchorgane, vor allem bei Ulcus ventr. und Ulcus duod., erhöhte Urinwerte gefunden werden, glaubt er an ein Übergreifen der Erkrankung auf das Pankreas. Leider wird in dem kurzen Referat im Zentralblatt nicht angegeben, ob Oesterberg für diese Annahme irgendwelche Beweise hat, etwa durch Operation oder Sektion nachgewiesene Veränderungen.

Für K r e c h ¹⁴⁾ ist jede Erhöhung des Harndiastasewertes auf 128 E. und darüber hinweisend auf eine Pankreasaffektion verschiedener Art und Schwere, die entweder primär gegeben ist oder sekundär durch ein Leiden in der Umgebung entstehen kann. Krech

nimmt an, daß z. B. bei Erkrankungen der Gallenwege reflektorisch ein Reiz ausgeübt wird, der einen Verschuß an der Papilla Vateri bedingt, oder daß es an dieser zu entzündlichen Schwellungen kommt.

In beiden Fällen ist dann Sekretstauung die Folge mit Übergang ins Blut, oder — bei längerer Dauer — mit Schädigung im Sinne der Nekrose der Drüse.

In den Fällen mit erhöhten Werten, in denen später die Operation ausgeführt wird, findet Kreh jedesmal die Beteiligung des Pankreas durch die anatomischen Veränderungen an demselben oder seinen Ausführungsgängen bestätigt. Auch er glaubt an einen Zusammenhang zwischen Schwere des Krankheitsbildes und jeweiliger Höhe des Diaftafewertes.

Cohn¹⁵⁾ teilt das Ergebnis von 96 Untersuchungen mit, bei denen man bestrebt war, bei Erkrankungen der Leber und der Gallenwege eine begleitende Pankreatitis zu finden. Das Hauptmittel ist ihm die Diaftafebestimmung im Harn und im Blut nach Wohlgemuth, weil die begleitende Pankreatitis „klinisch sonst verborgen bleibt“.

Bei 76 Patienten mit der Diagnose „Cholelithiasis“ wird 22mal eine Erhöhung der Harndiaftase, 8mal eine solche der Blutdiaftase festgestellt. Cohn nimmt als oberste Grenze der Norm im Blut 32 E., im Harn 64 E. an. Nur bei 5 von den 22 positiven Harnfällen wird auch klinisch eine Pankreatitis vermutet. Leider wird nicht angegeben, worauf der Verdacht sich stützt. Die restlichen 17 Patienten bleiben ohne jedes weitere Zeichen für eine Pankreatitis. Cohn versucht dann, eine Erklärung für die Diaftaseerhöhung zu geben: aus den Variationen in der Mündung des Ductus pancreaticus und des Ductus choledochus — daß beide durch eine Scheidewand getrennt münden, oder daß beide eine gemeinsame Öffnung an der Papille haben, oder daß der eine in den anderen mündet — kommt es bei einem Steinverschuß zu einer Stauung des Sekretes, zur Rückstauung und zum Übergang ins Blut und weiter in den Harn. Seine theoretische Überlegung findet Cohn in 7 Fällen durch die Operation oder die Sektion bestätigt. In weiteren 3 Fällen ergeben Operation oder Sektion ein Oedem des Pankreas,

welches nach Wohlgemuth gleichfalls zu einer Vermehrung der Harndiastase führt, denn durch die Kompression fallen einzelne Drüsenteile für die äußere Sekretion weg, und das Sekret gelangt folglich in Blut und Darm.

In 2 Fällen von durch Operation nachgewiesenem Eindringen eines Ulcus ventr. in die Bauchspeicheldrüse mit beträchtlichem Substanzverlust derselben ergibt sich ein normaler Wert vor und nach der Operation. Cohn erklärt dies aus der Langsamkeit, mit der die Pankreaschädigung sich entwickelt hat. Nach ihm wird ein Funktionsausfall einzelner Teile durch Mehrproduktion seitens anderer Drüsenteile rasch wieder ersetzt, worauf schon Heiberg²⁾ hingewiesen hat.

7 mal wird bei den Gallensteinerkrankungen mit normalen Diastasewerten operiert — und es finden sich keinerlei nachweisbare Änderungen an der Bauchspeicheldrüse.

Auch für Wildegans¹⁶⁾ ist eine Diastaseerhöhung wichtig und wertvoll zum Nachweis der akuten Pankreatitis oder der akuten Pankreasnekrose. Er behauptet, daß die Diastasekonzentration im Blute sehr konstant sei, im Urin sei sie dagegen viel wechselnder. Bei 9 Patienten hat er 2 Verfälscher: beidesmal trotz akuter Pankreatitis niedrige Blutwerte. Für ihn sprechen hohe Diastasewerte im Blut mit Sicherheit für eine akute Pankreaschädigung — er muß aber zugeben, daß niedrige und normale Werte eine solche nicht ganz ausschließen.

Die Erhöhung kommt seiner Meinung nach dadurch zustande, daß Bauchspeichel oder Drüsenparenchym in die Blutbahn gelangt infolge Sekretstauung in der Drüse selbst oder durch Resorption aus der Bauchhöhle.

Elmann¹⁷⁾ hat 5 Fälle veröffentlicht; 4 Werte weisen starke Erhöhung auf, wobei es sich um entzündliche Erkrankungen und um Cystenbildung gehandelt hat. Wertvoll ist die Tatsache, daß ein Fall von atrophierendem Pankreaskarzinom einen abnorm niedrigen Gehalt des Harns an Diastase aufweist. Die Werte werden zahlenmäßig nicht angegeben.

Douglas¹⁸⁾ betont, daß die Diastasebestimmung für die Diagnose der akuten Pankreatitis von Nutzen sei — sowohl in die

Diagnose stützenden bei positivem, wie eine Pankreatitis anschließenden Sinne bei negativem Ausfall.

Mikkelsen¹⁹⁾ hält die Diastasebestimmung für das wertvollste differentialdiagnostische Hilfsmittel zur Entscheidung der Frage, ob die Bauchspeicheldrüse mitbeteiligt ist bei Baucherkrankungen oder nicht. Für ihn ist jede stärkere Erhöhung pathognomonisch für eine Pankreaserkrankung! Leider ist in dem Referat im Zentralblatt nicht angegeben, ob und auf welches Beweismaterial Mikkelsen sich stützt.

Graßberger²⁰⁾ weist nach, daß der Diastasewert weitgehend unabhängig ist von der Nahrung, der Stunde der Blutentnahme, selbst von kurz vorausgegangenen Operationen. Er untersucht vor allem das ins Pankreas penetrierte Magen- und Duodenalgeschwür.

Bei 15 Patienten mit durch Operation sichergestelltem Ulcus ventr. finden sich normale, sehr konstante Blutdiastasewerte. Selbst wenn bei der Operation Pankreaschäden nachgewiesen werden — 8mal Penetration ins Drüsenparenchym, 4mal weitgehende Verwachsungen mit der Drüsenkapsel — ist der Diastasewert normal. Trotzdem müssen in diesen Fällen seiner Meinung nach ziemlich schwere Schädigungen der Bauchspeicheldrüse bestehen, da bei den penetrierten Ulcera eine Erhöhung des Blutzuckerpiegels gefunden wird als Zeichen für eine Affektion des Inselapparates. Graßberger kann sich nun schlecht denken, daß die Inseln allein geschädigt sein sollen und daß das sonstige Drüsenparenchym intakt ist.

Bei 15 Duodenalulcera werden 7mal Penetration bzw. Verwachsungen gefunden — und nur ein einziges Mal ist die Diastase vermehrt. Graßberger versucht eine Erklärung: für ihn ist wesentlich, wie lange die Erkrankung schon bestanden hat. Klinisch liegt ja keinerlei Anhalt vor, wann das Eindringen in die Substanz der Drüse stattgefunden hat. Im Augenblick des Penetrierens ist seiner Meinung nach die Drüse sicher entzündlich erkrankt, und es ergibt sich eine Diastasevermehrung. Damit erklärt er z. B. den einen Fall von Ulcus duod., bei dem die Diastaseerhöhung gefunden wurde — denn bei der Operation werden hier nur ganz leichte Verwachsungen festgestellt als Zeichen dafür, daß die Affektion vor

noch nicht allzulanger Zeit stattgefunden hat. Danach entwickeln sich dann Schwielen, Verwachsungen bilden sich, die akute leichte Entzündung geht in ein chronisches Stadium über und nun gibt es keine Erhöhung mehr. Und auch bei weiteren akuten Schüben resultiert keine Vermehrung, weil die Bauchspeicheldrüse nun nicht mehr so gut auf die akute schwere Schädigung reagieren kann. Graßberger fordert deshalb, daß beim Verdacht auf Pankreatitis vor der Bewertung und Beurteilung des Ergebnisses der Wohlgemuth'schen Diastasebestimmung erst genau geforscht wird, ob aus der Anamnese ein Anhalt für eine frühere Pankreaschädigung sich ergibt. Mit Hilfe dieser Theorie erklärt er sich auch die verschiedene Bewertung der einzelnen Autoren.

Wenn also bei einem bestehenden Magen- oder Duodenalgeschwür sich ein erhöhter Diastasewert findet, so ist ihm das ein Zeichen für das Eindringen in die Bauchspeicheldrüse. Eine fehlende Erhöhung schließt eine solche Penetration aber keineswegs aus, weil diese ja schon vor längerer Zeit stattgefunden haben kann.

Auch Lafsch²¹⁾ berichtet über 4 Fälle von in das Pankreas penetrierten Ulcera, bei denen er Vermehrung der Pankreasfermente, also auch der Diastase, gefunden hat.

In einer Umfrage beschäftigt sich Nordmann²²⁾ mit der Frühoperation von akuten Pankreatitiden und stellt dabei eine Anzahl genau formulierter Fragen. Hier interessiert nur die erste Frage:

„Halten Sie bei der akuten Pankreatitis bzw. Pankreasnekrose die Resultate der Diastasebestimmung im Blut und Urin im Verein mit den anderen klinischen Symptomen für ein einwandfreies Zeichen der akuten Pankreatitis bzw. Pankreasnekrose, oder haben Sie Fehldiagnosen erlebt?“ Er selbst sagt dazu in seiner Einleitung, daß bei akuten Pankreatitiden Erhöhung der Diastasewerte in Blut und Harn gefunden werden — und in den Fällen, bei denen Anamnese und Befund auf die Gallenblase oder die Gallenwege hinweisen, schließt er bei Druckempfindlichkeit auch im linken Epigastrium sowie Erhöhung der Diastasewerte in Blut und Harn auf eine Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse. Bei den dann vorgenommenen Operationen an der Gallenblase oder den Gallenwegen ergibt sich

jedesmal die Mitbeteiligung des Pankreas aus den angetroffenen typischen Fettgewebsnekrosen.

Für Schnitzler²²⁾ ist die Diastasebestimmung von hohem Wert. Daß bei weitgehendster Zerstörung oft keine Änderung, vor allem keine Erniedrigung oder gar Fehlen der Diastase zu finden ist, leuchtet ihm aus der Tatsache ein, daß Restdrüsenteile durch vermehrte Produktion in chronischen Fällen den Ausfall der anderen Teile weitgehend wettmachen; eine Tatsache, auf die neben Heiberg²⁾ auch der schon erwähnte Cohn¹⁵⁾ hingewiesen hat.

Walzel²²⁾ bezeichnet die Diastasebestimmung als durchaus zuverlässig für die Stützung der Diagnose Pankreatitis, allerdings nur im Verein mit anderen klinischen Untersuchungsergebnissen. Fehler führt er auf schlechte Reagenzien — vor allem Stärke — zurück.

Auch für Knoflach²²⁾ ist die Diastasebestimmung in Blut und Harn ein gutes Hilfsmittel in Verbindung mit dem klinischen Bild; seine in den genannten Medien gefundenen Werte sind durchweg erhöht. Nur in einem Fall ergibt die Sektion ein Verfallen der Methode, jedoch ist nicht gesagt, ob bei Pankreatitis ein normaler Wert gefunden wurde, oder ob einer Erhöhung keine Änderung am Pankreas entsprach.

Felsenreich²²⁾ hält nicht viel von der Diastasebestimmung, da sie zu oft im Stiche läßt. Er betont, daß die Werte im Harn und im Blut beim Einsetzen akuter Erscheinungen stark in die Höhe schnellen, daß sie aber sehr rasch wieder zur Norm zurückkehren. Weil die meisten Patienten aber erst 3 bis 4 Tage nach dem Beginn der akuten Erkrankung in Behandlung kommen, oft sogar noch später, mißt Felsenreich der Bestimmung nicht viel Wert bei. Nur eine Untersuchung in den allerersten Stunden hat Bedeutung für ihn. Die Erscheinung des Hochschnellens der Diastasewerte bei jedem Anfall von „Linkschmerz“ findet er immer wieder bestätigt — auch beim Penetrieren von Ulcera ins Pankreas.

Stich²²⁾ weist auf die vielen Fehlerquellen hin und zieht die Diastasebestimmung nur selten und nur zur Stützung der klinischen Diagnose heran. Vor allem stört es ihn, daß auch bei Ikterus höhere Werte gefunden werden.

Ebenfalls nur zur Stützung der aus anderen klinischen Untersuchungen gewonnenen Diagnose zieht O e h l e c k e r ²²⁾ die Diafstafebestimmung heran. Auch da noch ist sie ihm kein zuverlässiges Mittel.

Für R o f t ²³⁾ ist die Diafstafebestimmung im gepufferten Urin eine sehr gute und sehr zuverlässige Methode, weil sie ihm bei Erkrankungen anderer Bauchorgane, vor allem bei Gallensteinerkrankungen, anzeigt, ob das Pankreas mitbeteiligt ist oder nicht.

In allen Fällen von Pankreaserkrankungen findet P o p p e r ²⁴⁾ eine Erhöhung des Diafstafewertes im Blut. In allen Fällen ergibt die vorgenommene Operation die Richtigkeit der vorher gestellten Diagnose. Allerdings muß Popper zugeben, daß auch bei Choledochussteinen hohe Werte gefunden werden, doch glaubt er dabei an einen sekundären Choledochusstein bzw. an ein dadurch bedingtes sekundäres Oedem des Pankreas, welches er als einen Vorläufer der akuten Pankreatitis ansieht, ohne aber Belege für seine Ansicht zu bringen. Leider sind auch keine Werte angegeben.

Wenngleich er keinen Zusammenhang zwischen der Schwere der Erkrankung und der Höhe des Diafstafewertes feststellen kann, so schließt er doch bei fehlender Diafstafevermehrung eine akute Bauchspeicheldrüsenerkrankung mit großer Sicherheit aus.

Auch in subakuten Fällen findet er eine Erhöhung des Diafstafewertes, allerdings nicht in dem Maße wie bei akuten Affektionen. Wichtig dürfte weiter sein, daß er bei Pankreastumoren nur selten eine Erhöhung nachweisen kann, sondern im Gegenteil oft niedrigere Werte findet.

Dagegen findet R o f t o c k ²⁵⁾ in subakuten und chronischen Fällen von Pankreatitis keine Diafstafevermehrung. Im akuten Stadium jedoch stellt er eine starke Erhöhung des Wertes fest, so daß er zu der Annahme berechtigt zu sein glaubt, bei fehlender Diafstafeerhöhung in akuten Bauchzuständen eine akute Pankreatitis oder Pankreasnekrose ausschließen zu können. Häufig findet er bei Magen- und Duodenalgeschwüren eine Diafstafevermehrung. Das ist ihm ein Zeichen für einen gleichzeitigen Prozeß am Pankreas, meist im Sinne einer Penetration oder aber einer leichten Pankreatitis.

Ein Fehlen der Diaftafeerhöhung schließt einen solchen Prozeß jedoch nicht aus.

Die bei akuter Cholelithiasis gefundenen oft sehr hohen Werte hält Rostock für den Ausdruck einer Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse.

Bei allen möglichen anderen Erkrankungen kann er keine Änderung des Harn- und Blutdiaftafewertes gegenüber der Norm beobachten.

Thomson²⁶⁾ findet bei vielen Kranken mit septischer Appendicitis einen erhöhten Diaftafewert und führt diese Erhöhung ebenfalls auf eine leichte begleitende Pankreatitis zurück. Er versucht, für seine Anschauung einen Beweis zu erbringen und stellt daher Zuckerbelastungsproben an — und tatsächlich stellt er fest, daß die Zuckerausscheidungskurven nicht der sonstigen Norm entsprechend verlaufen, was ihm ein Beweis für die leichte Pankreasschädigung ist. Allerdings könnte man m. E. diesen anderen Verlauf der Ausscheidungskurve auch auf das bei einer Sepsis vorhandene Darniederliegen des gesamten Organismus zurückführen.

In etwa einem Drittel der Fälle nach Magenresektion, desgleichen nach vielen Gastro-Enterostomien und nach Operationen an Gallenblase und Gallengängen stellt Ringdall²⁷⁾ eine Erhöhung des Diaftafewertes fest. Dabei glaubt er an eine Schädigung der Bauchspeicheldrüse, läßt aber die Möglichkeit offen, daß es sich auch um eine Hinderung des normalen Sekretabflusses handeln kann. Nach dem Abklingen dieser ersten postoperativen Erhöhung findet er etwa am achten bis zehnten Tage ein abermaliges Ansteigen des Diaftafewertes. Diese zweite Diaftasurie führt er auf vermehrte Sekretion infolge der nun stärkeren Nahrungsaufnahme zurück. Eine solche Abhängigkeit des Diaftafewertes von der Nahrungsaufnahme bestreitet allerdings v. Straffer¹⁰⁾, auf Grund seiner Versuchsreihen: 10 pankreasgefunde Patienten werden vorwiegend mit Kohlehydraten, 10 weitere Patienten vorwiegend mit Eiweiß ernährt; weder bei der einen noch bei der anderen Versuchsreihe ändert sich der Diaftafewert irgendwie; die Art und die Menge der Nahrung hat also nach v. Straffer keinen Einfluß auf den Diaftafewert. Ebenfalls bestätigt Kaczander²⁸⁾ die Unabhängigkeit des Diaftafewertes von Qualität und Quantität der Nahrung.

Die postoperative Diaftasurie bestätigt auch Foged²⁹⁾. Ein ziemlich frühes Auftreten führt er auf Narkoseschäden zurück — tritt sie erst nach einiger Zeit auf, schuldet er eine Wundinfektion an. Die bei Gallensteinleiden sehr oft gefundene vermehrte Diaftasurie bringt er ebenfalls mit der Bauchspeicheldrüse in Verbindung — er glaubt an entzündliche Veränderungen, vielleicht auch an eine Sekretstauung, ohne mit Beweisen dienen zu können. Im übrigen können seine Werte und Ergebnisse schlecht mit denen anderer Autoren verglichen werden, da er nicht die Original-Wohlgemuth-Methode verwendet, sondern ein nach Fabricius-Möller erheblich vereinfachtes Verfahren der Methode. Seine Werte liegen durchweg ziemlich hoch.

Wenn bei unklaren Baucherkrankungen der Diaftasewert keine Erhöhung zeigt, glaubt Baumann⁸⁾ eine Mitbeteiligung des Pankreas ausschließen zu können; denn seiner Meinung nach weist jede Vermehrung des Diaftasewertes auf eine Pankreasaffektion hin, wenigstens hat er bei seinem Material keinen einzigen Verfälscher gehabt. Er hält einen Zusammenhang zwischen Diaftasegehalt und Schwere der Erkrankung für gegeben: je höher der Diaftasegehalt, desto schwerer die Erkrankung, desto ausgesprochener die anatomischen Veränderungen an der Bauchspeicheldrüse. Baumann arbeitet, wie erwähnt, nach einer eigenen Modifikation der Original-Wohlgemuth-Methode (Pufferlösung mit P_h -Optimum bei 6,8).

Eine weitgehende Unabhängigkeit des Urindiaftasewertes von Nahrung, Tageszeit, selbst von der Konzentration des Harns stellt Kaczander²⁸⁾ fest. Der höchste Normalwert beträgt bei ihm 64 E. — 128 E. sieht er schon als pathologisch an. Auf Grund der erhöhten Werte, die er bei Erkrankungen der Gallenblase, der Gallenwege, bei Magen- und Duodenalgeschwüren und anderen findet, schließt er auf eine sekundäre Mitbeteiligung des Pankreas. Allerdings ist diese Erhöhung des Harndiaftasewertes der einzige Beweis, den er für diese Anschauung hat, sonst spricht nicht das Geringste im klinischen Bild für eine Pankreasschädigung — Operationsberichte oder Sektionsprotokolle liegen nicht vor.

Nach Kaczander kann eine solche leichte Pankreatitis eine Vorstufe sein zu späteren ernsthaften Pankreasschädigungen.

Bei aus dem klinischen Bild mit größter Wahrscheinlichkeit gestellter Diagnose auf akute Pankreatitis in 4 Fällen finden sich Werte bis 1024 E. — die Diagnose wird in 2 Fällen durch die Operation bestätigt. Auch bei 9 chronischen Pankreatitiden findet Kaczander Werte über 64 E. Bei den fortlaufend vorgenommenen Reihenuntersuchungen dieser 9 chronischen und der 4 akuten Fälle glaubt er, je nach der Höhe des Diastasewertes auf akute Schübe sowie auf Besserung und Abklingen des Prozesses schließen zu können. Das ist also ein Zusammenhang zwischen Schwere der Erkrankung und Grad der Diastaseerhöhung, wie er ebenfalls angegeben ist von dem schon angeführten J a n k e r ¹¹⁾, sowie von K r e c h ¹⁴⁾, wie er bestritten und abgelehnt wird von R o l o f f ¹²⁾ und von P o p p e r ²⁴⁾.

Auch über drei Fälle von Fleischvergiftung berichtet Kaczander, bei denen Werte bis zu 512 E. gefunden werden, eine Erklärung für diese Erhöhung zu geben lehnt er ab.

Für N i s s e n ³⁰⁾ hat die Diastasebestimmung im Urin im Verein mit anderen klinischen Symptomen diagnostische Bedeutung, wobei er nach langjährigen Erfahrungen der Schule v. Bergmann's Werte über 64 E. als pathologisch ansieht. Auch er kommt bei solch erhöhten Werten zur Annahme einer Pankreasaffektion.

Für S c h o r l e m m e r ³¹⁾ ist die Vermehrung der Diastase im Blut neben Head'scher Zone, Linkschmerz ohne Bauchdecken-Spannung, Fleisch- und Fettstühlen ein ausschlaggebendes Mittel zur Erhärtung der Diagnose Pankreatitis. Bei Pankreaserkrankungen findet er bei seinen Operationen immer wieder Störungen und anatomische Veränderungen an der Gallenblase, den Gallenwegen, dem Magen oder dem Duodenum. Und diese Erkrankungen schuldigt er als Ursache für die Pankreasschädigung an — und daher kommt er zu dem Schluß, daß eine sekundäre Mitbeteiligung des Pankreas vorliegt, wenn der Diastasewert im Harn und vor allem im Blut bei Erkrankungen der oben genannten Organe erhöht ist.

v. R e d w i t z ³²⁾ hält nicht viel von der Diastasebestimmung. Die Methode ist ihm nicht zuverlässig, auch nicht schnell genug — nähere Gründe für die Ablehnung gibt er sonst nicht an.

Ebenfalls hält de Tullio³³⁾ nichts davon, weil er fast dauernd andere Werte erhält wie die übrigen Untersucher — und weil seine eigenen Werte völlig voneinander abweichen. So findet er z. B. bei Diabetes mellitus im Harn normale Werte und im Blut eine Vermehrung der Diastase.

Vogel³⁴⁾ ist der Ansicht, daß die Halbstundenuntersuchung keine einwandfreien Resultate ergibt, nähere Gründe führt er nicht an. Die 24-Stunden-Methode hat „wahrscheinlich“ ein besseres Ergebnis, dauert ihm aber zu lange.

Daß Felfenreich²²⁾, Stich²²⁾ und Oehlecker²²⁾ nicht viel von der Diastasebestimmung halten, wenngleich sie nicht zur ausgesprochenen Ablehnung kommen, wurde bei Nordmanns²²⁾ Rundfrage schon erwähnt.

Der Wert der Diastasebestimmung ist also von den meisten Autoren anerkannt. Man kann sagen: daß der Wert anfangs sogar überschätzt worden ist, denn jede Änderung des Diastasegehaltes wird anfangs immer auf die Bauchspeicheldrüse bezogen — mit der einen Einschränkung, daß eine Parotitis vorher ausgeschlossen werden muß.

Nach und nach mehrten sich jedoch die Stimmen, die eine Änderung des Diastasewertes — Erhöhung oder Erniedrigung — nicht auf die Bauchspeicheldrüse allein beziehen, sondern die daran denken, daß sie auch von seiten eines anderen Organs bedingt sein kann.

Schon Wohlgemuth¹⁾ selbst hat auf die Parotitis als Ursache einer Diastasevermehrung hingewiesen. Desgleichen hat er des öfteren bei Nierenleiden einen abweichenden niedrigen Wert gefunden.

Das kann m. E. aus der Tatsache erklärt werden, daß die geschädigte Niere nun nicht mehr wie in gefunden Zeiten in der Lage ist, alle Stoffe, hier die Diastase, auszuschcheiden, sondern daß sie einen Teil im Blute zurückhält. Das erklärt dann den höheren Blutwert und die oft erniedrigte Harndiastase. Schwierig wird die Sache aber, wenn ein höherer Blutwert bei normaler oder gar bei

erhöhter Harndiaftase vorliegt. Meist wird aber bei Nierenerkrankungen ein niedriger Diaftasegehalt des Urins gefunden.

P i n n a ³⁵⁾ legt großen Wert auf die Diaftasebestimmung zur Feststellung von Nierenschädigungen. Für ihn kommt es vor allem auf den Unterschied zwischen Blut- und Harndiaftase an, und er hat sogar versucht, den Unterschied zahlenmäßig zu fassen und in eine Formel zu bringen, den „Diaftatischen Index“:

$$\frac{X}{Y \cdot \sqrt{y}}$$

wobei X = Diaftasewert im Blut,

Y = Diaftasewert im Harn ist.

Für gewöhnlich ist dieser diaftatische Index kleiner als 1, aber bei Nierenschädigungen steigt er an und wird bis zu 6,0! Aus der Höhe des Anstiegs schließt Pinna auf die Schwere der Schädigung — die Form der Nierenerkrankung spielt dabei keine Rolle.

Bei allen möglichen Erkrankungen anderer Organe findet er keine Änderung des Index, wenn die Nieren nicht geschädigt sind, auch nicht bei Pankreaserkrankungen oder bei Diabetes mellitus.

Was schon W o h l g e m u t h ¹⁾ aufgezeigt hat, nämlich den niedrigen Diaftasewert im Harn bei Nierenschädigungen, bestätigt auch S c h m e r e l ³⁶⁾, dieser vor allem bei Nephritis.

Auch M a r i n o ³⁷⁾ und N o g u c h i ³⁸⁾ gelangen zu demselben Ergebnis.

Für den ersteren ist vor allem der Unterschied des Diaftasewertes im Urin der rechten und linken Niere zur genaueren Lokalisation der Erkrankung wichtig. Ein sicheres Verhältnis zwischen Schwere der Erkrankung und Grad der Diaftaseerniedrigung findet er jedoch nicht. Wohl aber neigt er zu der Auffassung, daß bei Diabetes mellitus die Krankheit um so schwerer und prognostisch ernster ist, je stärker die Diaftaseverminderung im Urin auftritt. Überhaupt ist Marino bemüht, Zusammenhänge zwischen Diaftasewert und Schwere der Erkrankung festzustellen. So findet er z. B. auch bei primären und sekundären Anämien Verminderung des Diaftasegehaltes im Urin — bei Perniciosa eine etwas stärkere Erniedrigung — und bei dieser glaubt er sogar ein gewisses Verhältnis zwischen Diaftasewert und Erythrocytenzahl gefunden zu haben.

Auch Mellinghoff³⁹⁾ findet bei Funktionsuntüchtigkeit der Nieren, vor allem bei Kochsalzmangel (hypochlorämische Urämie) niedrige Diaftafewerte — allerdings läßt er sich nicht aus über den Blutdiaftafespiegel. Auch gibt er keine genaueren Zahlenwerte an. Bei Schrumpfniere stellt er gleichfalls eine Erniedrigung fest.

Jede Blutdiaftafeerhöhung ohne gleichzeitige entsprechende Erhöhung des Diaftasegehaltes im Urin weist Mellinghoff darauf hin, daß die Nierenfunktion nicht intakt ist. Beweisend für ihn in dieser Richtung ist der Wiederanstieg auf normale Werte nach Wiederherstellung der normalen Verhältnisse.

Auch Schaanning⁶⁾ findet eine Erniedrigung des Harn-diaftafewertes bei Nierenerkrankungen. Das Verhältnis von Harn-diaftafe zur Blutdiaftafe faßt er in eine Formel:

$$\frac{du \cdot D}{\frac{15}{d_s}}$$

wobei du = Diaftafewert im Urin,

ds = Diaftafewert im Serum

bedeutet, beide bestimmt nach der Wohlgemuth'schen Methode,

D = Diaftafe im 24-Stunden-Harn ist.

Der Endwert nach Einsetzen der gefundenen Größen wird in Hundertteilen des Serumwertes angegeben; er beträgt normal nicht unter 320%. Dieser Hundertsatz ist jedoch herabgesetzt bei akuter und chronischer Nephritis, bei Nephrosclerose und oft bei Schwangerschaftsnephropathie. Aus dem Grade der Herabsetzung, also aus der mangelnden Konzentrationsfähigkeit für die Diaftafe schließt Schaanning auf die Schwere des vorliegenden Krankheitsfalles.

Auf die Verminderung des Diaftasegehaltes im Urin bei Diabetes mellitus hat schon Wohlgemuth¹⁾ hingewiesen. Und fast alle Nachuntersucher können diese Tatsache bestätigen, daß sowohl im Harn als auch im Blut der Diaftasegehalt bei Diabetes mellitus vermindert ist. Nur wenige Autoren gelangen zu anderen Ergebnissen.

Daß de Tullio³³⁾ normalen oder gar leicht erhöhten Harn-
diastasegehalt und einen erhöhten Blutwert bei Diabetes mellitus
findet, wurde schon erwähnt.

Auch Meyers⁴⁰⁾ und Fuchs⁴¹⁾ finden höhere Blutdiastase-
werte, während im Gegensatz zu ihnen Ghedini⁴²⁾ ein fast völliges
Fehlen der Harndiastase feststellen kann.

Im Gegensatz zu Marino findet Bettoni⁴³⁾ keine Parallele
zwischen Stärke der Diastasefenkung und Schwere des Krankheits-
bildes bei Diabetes mellitus. Wichtig ist jedoch, daß er zwei Fälle
erwähnt, in denen keine Diastaseverminderung vorhanden ist, in
denen er vielmehr einen sehr hohen Diastasewert beobachtet.
Bettoni ist der Ansicht, daß diese beiden Fälle nicht pankreatogenen
sondern hypophysären Ursprungs sind, ohne allerdings seine An-
schauung näher zu beweisen — wenigstens wird in dem Referat
im Zentralblatt nichts über eine Beweisführung gebracht.

Bettoni stellt Reihenuntersuchungen an und findet, daß nach
Insulintherapie der Diastasewert wieder zur Norm und oft sogar
darüber ansteigt. Dieser Anstieg ist jedoch manchmal sehr langsam
und viel weniger deutlich — und in diesen Fällen glaubt Bettoni
an gleichzeitige arteriosklerotische Änderungen des Gesamtorga-
nismus.

Viel wichtiger jedoch als die niedrigen sind die erhöhten Dia-
stasewerte.

Weitere Autoren, die die Vorherrschaft der Bauchspeicheldrüse
für die Diastasevermehrung anzweifeln, schließen sich den schon er-
wähnten an.

So glaubt Lopper⁴⁴⁾ durchaus nicht an eine Mitbeteiligung
des Pankreas, wenn er bei Cholelithiasis sogar extrem hohe Werte
findet und kein anderes Zeichen für eine Pankreatitis spricht. Der
positive Ausfall der Bestimmung — also die Erhöhung — ist für
ihn nicht beweisend für eine Pankreasaffektion.

Die erhöhten Fermentmengen im Blut sind für Roseno⁴⁵⁾
nur ein Ausdruck für die Rückstauung in's Blut. Das sonstige klini-
sche Bild muß Aufschluß darüber geben, was die Ursache für diese

Rückstauung ist: Pankreatitis, entzündliches Oedem der Umgebung bei Gallenblasen- oder Gallenwegserkrankungen, Steinverschluß der Papille oder Nierenfchädigungen.

Er legt Hauptgewicht auf den Blutwert, da nach seiner Meinung bei akuter Pankreatitis bzw. Pankreasnekrose die Nieren toxisch geschädigt sein können und die Fermente nicht mehr wie früher ungehindert passieren lassen, der Harnwert somit also zu niedrig sein kann.

Ein negativer Ausfall der Bestimmung, also ein normaler Wert, hindert Roseno nicht, doch eine akute Pankreatitis anzunehmen, wenn das sonstige Bild dafür spricht, wie 2 seiner Fälle ihm beweisen, die er als Beispiel anführt.

Wakefield⁴⁶⁾ findet bei Diastasebestimmungen in 30 verschiedenen Fällen ohne Pankreaserkrankungen zweimal eine merkliche Erhöhung, und zwar bei Akromegalie, also einer Hypophysenstörung. Das deckt sich mit den beiden Diabetesfällen hypophysären Ursprungs, die Bettoni⁴³⁾ angeführt hat. Allerdings muß gesagt werden, daß Wakefield nur sehr hohe Werte als pathologisch ansieht und noch Werte als normal gelten läßt, die für andere Untersucher schon deutlich erhöht sind — genaue Zahlen allerdings fehlen in dem Referat des Zentralblattes.

Lindemann⁴⁷⁾ weist schon 1910 nach, daß bei Hypersekretion des Magens ein höherer Diastasewert zu finden ist. Er benutzt die kombinierte Untersuchung von Harn und Stuhl nach der Wohlgemuth'schen Methode und verlangt, daß in beiden der Wert erhöht ist, wenn die Diagnose auf Hypersekretion gestellt werden soll.

Hegge⁴⁸⁾ weist darauf hin, daß eine vermehrte Diastaseausscheidung auch bei Ulcus ventriculi perforans zu finden ist, die ihren Grund zwar häufig, aber lange nicht immer, in einem sekundären Oedem der Bauchspeicheldrüse hat. Und auch bei Durchtritt eines Gallensteins ist eine Diastaseerhöhung ohne jegliche Parenchymänderung des Pankreas feststellbar. Eine erhöhte Diastaseurie ist für ihn keineswegs pathognomonisch für eine Pankreaserkrankung.

Nach Glykofegabe stellt Caffano⁴⁹⁾ im Urin eine deutliche Vermehrung der Diastase fest bei seinen Fällen von Lebercirrhose und Leberlues. Eine Verminderung findet er nur in einzelnen Fällen von Stauungsleber und Infantilismus.

In 75% der untersuchten Fälle von Leberkrankheiten weist Crandall⁵⁰⁾ eine Erhöhung der Blutdiastase nach, desgleichen in 48% der Fälle von multipler Sklerose.

Sotgiu⁵¹⁾ findet nur in 35,7% der untersuchten Fälle von Leberkrankheiten eine Diastasevermehrung, bei Ulcera schon in 50%, bei Cholangitis und bei Cholelithiasis in 52% und bei Parotitis natürlich in 100% der Fälle. Bei Diabetes mellitus und bei Magenkarzinomen stellt er nur in je 40% der Fälle eine Änderung gegenüber der Norm fest.

In Hirschhorn's⁵²⁾ Arbeit über Diastasebestimmung bei Pankreatitis und Parotitis wird gesagt, daß der Diastasewert allein nicht maßgebend sei für die Diagnose Pankreatitis, weil eine Erhöhung der Diastase auch bei anderen Krankheiten gefunden werde, z. B. bei Parotitis, bei Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge.

Daß die Kurven bei Blutzuckerbelastungsproben, die er bei vielen Patienten anstellt, nicht normal verlaufen, stört ihn nicht. Er ist der Ansicht, daß die Zuckerbelastungskurve bei Fiebernden sehr oft abnorm verläuft, er hat sogar gefunden, daß selbst ganz geringe operative Eingriffe für mehrere Tage einen anders gearteten Verlauf bedingen. Demnach wäre dem früher angeführten Versuch von Thomsen²⁶⁾ nicht viel Bedeutung beizumessen; Thomsen liest ja aus dem Verlauf der Blutzuckerbelastungskurve eine leichte die Appendicitis begleitende Pankreatitis heraus.

Block⁵³⁾ beschäftigt sich mit dem Diastasewert bei Magengeschwüren. Und je nach der Höhe des Diastasewertes im Blut schließt er auf eine bestimmte Lokalisation des Ulcus bzw. auf Mitbeteiligung der Nachbarschaft. Er kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:

1. Eine gewaltige Diastasevermehrung zeigt ein direktes Verwachsen mit dem Pankreas an oder gar eine Perforation in dasselbe.

2. Eine mittlere Vermehrung gibt Aufschluß über entzündliche Beteiligung der Nachbarschaft (Perigastritis). Sie läßt den Sitz des Ulcus an der kleinen Curvatur, der Magenhinterwand, dem oberen Teil der Vorderwand und evtl. am Duodenum vermuten.
3. Bei normalen oder gar erniedrigten Werten ist der Sitz des Ulcus am Pylorus, an der großen Curvatur oder an der Cardia. Der Sitz kann auch wie bei 1. und 2. sein, aber dann fehlen die perigastritischen Erscheinungen.

Die perigastritischen Verwachsungen spielen also für Block eine große Rolle. Er zieht die Bestimmung der Diaftase im Serum vor, weil die normale Schwankungsbreite nicht so groß ist wie bei der Harndiaftase.

Warum G r a ß b e r g e r ²⁰⁾ bei seinen ins Pankreas penetrierten Ulcera normale Diaftasewerte im Gegensatz zu Block findet, ist erklärt worden. Graßberger ist der Ansicht, daß Block, der durchweg Diaftasevermehrung beobachtet hat, frische Fälle mit frischem Eindringen in seiner Klinik hatte, während bei ihm selber der Zeitpunkt der Penetration ins Pankreas oder der peripankreatitischen Entzündung mit nachfolgender Verwachsung viel länger zurücklag.

S k o o g⁹⁾ hat eingehende Untersuchungen an einem großen Krankenmaterial angestellt und kommt zu folgenden Ergebnissen:

Als pathologisch läßt er im Harn erst Werte über 256 W.E. gelten. 128 E. können seiner Meinung nach noch völlig normal sein. Und selbst 256 E. haben für ihn noch keinen differentialdiagnostischen Wert, da sie nur anzeigen, daß die Bauchspeicheldrüse bei akuten Bauchzuständen irgendwie reagiert hat. Ausdrücklich betont Skoog, daß selbst sehr hohe Diaftasewerte nicht immer pankreatogen sind. Das Vermögen, Diaftase zu produzieren, haben nach ihm alle glykogenhaltigen Organe und Zellen. Seine untersuchten Patienten teilt er in verschiedene Gruppen ein:

1. 10 Fälle von Pankreaserkrankungen zeigen 8mal den Wert von 1024 E., und 2mal den von 2048 E. — die Diagnose ist jedesmal durch Operation bzw. Sektion sichergestellt.

2. Von 155 Patienten mit Cholelithiasis mit und ohne begleitende Cholecystitis zeigen 14 einen Harndiaftafewert von 512 E. und darüber. Sämtliche 14 Patienten werden operiert, bei keinem läßt sich durch Palpation oder Inspektion eine Änderung am Pankreas feststellen.
3. Diese Nachkontrolle der Bauchspeicheldrüsen kann nicht vorgenommen werden bei 7 Fällen mit Diaftasevermehrung von 15 Patienten, die an Choledochussteinen leiden, da diese 7 Patienten nicht operiert worden sind. Skoog findet, daß die vermehrte Diaftasurie nach Gallensteinfällen jedesmal nur 1 bis 1½ Tag anhält, ein sonstiges Zeichen von Affektion des Pankreas fehlt dabei völlig. Diese vermehrte Ausscheidung ist wahrscheinlich durch Stauung infolge Verstopfung der Papilla Vateri bedingt.
4. 11 akute Bauchfälle zeigen Diaftafewerte von 512 und mehr, bei allen sind jedoch andere Pankreas Symptome vorhanden. Nur 1 Patient ist operiert worden, und es zeigt sich die Penetration eines Ulcus ins Pankreas, die aber schon vor längerer Zeit erfolgt sein muß, da viele feste, schwielige Verwachsungen vorliegen und da der Patient schon zweimal vorher mit gleichen Beschwerden aufgenommen war und jedesmal hohe Diaftafewerte gehabt hat. Das ist also ein Gegensatz zu Graßberger²⁰⁾, bei dem eine Penetration vor längerer Zeit keine neuerliche Diaftaseerhöhung verursacht, weil seiner Meinung nach die chronisch geschädigte Bauchspeicheldrüse nicht mehr die Kraft hat, auf einen neuen akuten Reiz hin mit einer vermehrten Diaftaseausscheidung zu antworten.
5. Bei einer großen Zahl von Baucherkrankungen der verschiedensten Art findet Skoog unter 40 Appendiziten einmal eine Erhöhung des Harndiaftafewertes auf 1024 E., ohne daß die Operation und die nachfolgende Sektion eine makroskopische Änderung am Pankreas gezeigt hätten.

Skoog kann aus dem Diaftafewert keine prognostischen Schlüsse ziehen, lehnt weiterhin einen Zusammenhang zwischen Schwere der Erkrankung und dem Diaftaspiegel ab, denn er findet, daß

hohe Werte meist klinisch leichter verlaufen und mit weniger anatomischen Änderungen einhergehen, als niedrigere Werte.

Eine Vermehrung der Harndiaftase weist ihn in erster Linie auf die Bauchspeicheldrüse, dann aber auch auf ein Gallenleiden hin. Bei anderen Erkrankungen ist der Diaftasewert nur selten erhöht, meist ist das Pankreas dann leicht mitbeteiligt, ohne daß dies Einfluß auf das urfächliche Leiden hätte. „Man besitzt in den erhöhten Diaftasewerten bei der Wohlgemuth'schen Diaftasereaktion kein zuverlässiges Hilfsmittel für die Diagnose von akuten Pankreasveränderungen bei unklaren Bauchfällen.“ Bei Pankreassymptomen jedoch stützt eine vorhandene Vermehrung die Diagnose auf Pankreatitis, ein normaler Wert schließt sie aus, wenn die Bestimmung 1 bis 1½ Tage nach den ersten Symptomen vorgenommen wird. Wenn Gallenwegserkrankungen vorliegen, und die Diaftase ist vermehrt ohne Zeichen seitens des Pankreas, dann weist ihn das in erster Linie auf einen Stein hin, weil er bei Cholelithiasis 5mal so oft eine Vermehrung gefunden hat als bei anderen Gallengangserkrankungen.

Die erhöhten Werte bei Gallenleiden sind ihm eine Warnung für eine evtl. komplizierende Pankreatitis, weil dann nämlich anatomische Gallenwegsverhältnisse vorliegen, die ein Überfließen von Galle in den Pankreasausführungsgang ermöglichen und folglich dann eine Pankreasnekrose verursachen können. „Diese erhöhte Diaftasurie zeigt eher als andere klinische Symptome eine beginnende Reizung des Pankreas bei Gallengangsleiden an.“ Gleich Graßberger²⁰⁾ fordert Skoog für die Beurteilung der Reaktion eine genaue Berücksichtigung der Dauer der Krankheits Symptome.

Koch⁵⁴⁾ berichtet über 2 Fälle von Pfortaderthrombose mit erheblicher Diaftasevermehrung. Vorher erwähnt er 2 Fälle von Skoog und von Just, welcher letzterer eine beträchtliche Diaftaserhöhung — genaue Zahlen fehlen — bei Thrombose im Netz gefunden hat, ohne daß die Bauchspeicheldrüse irgendwie nachweisbar geschädigt war. Der erste Fall von Koch wird unter der Diagnose einer sehr akuten Pankreatitis und den typischen Symptomen eingeliefert, bei der Operation und der späteren Sektion

stellt sich eine Thrombose der Pfortader, sowie der Vena mesenterica sup. und der Pankreasvenen heraus; hier lag also eine Mitbeschädigung der Bauchspeicheldrüse vor. Der zweite Fall wird mit ähnlichen Erscheinungen eingewiesen und weist einen Harnwert von 1024 E. auf; bei der Operation und der späteren Sektion wird einwandfrei festgestellt, daß die Bauchspeicheldrüse völlig ohne pathologischen Befund ist, daß vielmehr eine Thrombose der Pfortader, der Vena mesenterica sup. und der Milzvene vorliegt. Koch kommt daraufhin zu dem Schluß, daß eine akute Pankreatitis und eine Pfortaderthrombose, die auch im sonstigen klinischen Bild sehr ähnliche Erscheinungen machen, sich selbst mittels der Wohlgemuth'schen Diafastabestimmung nicht trennen lassen.

Adam⁵⁵⁾ findet, daß bei gleicher Kost im Harn von Rachitikern beträchtlich mehr Diafaste ist als im Harn von Nichtrachitikern. Er stellt auch einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem Harndiafastespiegel fest insofern, als bei Heilung der Diafastewert wieder abnimmt und normal wird.

Dodds⁵⁶⁾ glaubt eine Erklärung für diese erhöhte Diafasturie bei Rachitiskranken in einer begleitenden Pankreatitis zu haben; als hinweisend auf diese führt er die mangelhafte Fettspaltung der Rachitiker an.

Auch Renke⁵⁷⁾ behauptet, daß höhere Diafastewerte bei Rachitis gefunden werden. In ihren Versuchen über experimentelle Rattenrachitis findet sie bei den Ratten eine Verminderung, doch sagt sie, in ihren Versuchen festgestellt zu haben, daß es bei Menschen umgekehrt eine Erhöhung gäbe.

Das Verhalten der Diafaste in Blut und Urin untersucht Germer⁵⁸⁾. Er stellt eine Erhöhung im Urin in 73% der Fälle fest — im Blut dagegen nur bei 39% der untersuchten Patienten. Diese Steigerung hält lange an, bis zu 50 Tagen, ist aber nicht abhängig vom Allgemeinbefinden des Patienten oder von der Höhe des Fiebers. Aus der Erhöhung kann Germer keinerlei diagnostische oder gar prognostische Schlüsse ziehen und nur in 1 Fall von 11 untersuchten Patienten werden bei der Sektion histologische Änderungen am Pankreas festgestellt. Dagegen findet er, daß bei 10 Leberkranken mit erhöhten Diafastewerten die Sektion 6 mal er-

gibt, daß das Leberparenchym degeneriert oder entzündlich verändert ist.

Garry⁵⁹⁾ sieht hohe Diastafewerte als pathognomonisch für eine Pankreaserkrankung an, vor allem im Sinne der akuten Pankreasnekrose. Aber den meist gefundenen nur mäßigen Erhöhungen mißt er nur einen sehr zweifelhaften Wert für die Pankreasdiagnostik bei. Zwar gibt er zu, daß die Bauchspeicheldrüse bei Erkrankungen der Leber- und Gallenwege oft mitbeteiligt ist, doch weist er darauf hin, daß eine Erhöhung des Diastafewertes im Blut und im Harn nicht unbedingt für Pankreatitis spricht, sondern daß diese Erhöhung auch sehr gut das Zeichen einer im Körper bestehenden Infektion ohne jegliche Affektion des Pankreas sein kann. In seinem Material findet er eine mäßige Steigerung bei allen möglichen Erkrankungen, z. B.: dekompensierte Myokarditis, Endokarditis, Kreislaufinsuffizienz, Oesophagus- und Magen-Ca., Kolitis, Ulcus ventriculi et duodeni, Icterus, Hepatitis, abgedingende Appendicitis, Adnexentzündung.

Ebenfalls für das Verhalten der Diastase bei Infektionskrankheiten interessiert sich Grumke⁶⁰⁾. Das Ergebnis seiner Untersuchungen dürfte mehr als das aller anderen Autoren geeignet sein, den Satz umzu stoßen: daß eine Diastaseerhöhung nur auf eine Pankreasaffektion hinweisend sei. Findet er doch in 25 Typhus- bzw. Paratyphusfällen die Harndiastase immer erheblich vermehrt, 3 mal bis auf 512 E., 9 mal auf 256 E. Und zwar geht seiner Meinung nach die Schwere der Krankheit parallel der Diastasevermehrung, während in der Rekonvaleszenz ein allmähliches Abklingen zur Norm zu beobachten ist. In 57 Diphtheriefällen kann er meist eine Erhöhung verzeichnen, doch nicht so regelmäßig wie bei Typhus. Desgleichen ist die Höhe des Diastafewertes nicht so sicher wie bei Typhus von der Schwere der Krankheit abhängig. So findet sich in einigen schwersten toxischen Fällen völlig normaler Diastafewert. Auch kann er keinerlei Beziehung zwischen Höhe der Temperatur oder zwischen dem Auftreten von Komplikationen und Diastafewert nachweisen. Bei 31 schweren Tonsillitiden ergibt sich in 50% der Fälle eine Diastaseerhöhung. Auch hier finden sich keinerlei Beziehungen, die auf einen Zusammen-

hang hinweisen. Scharlachkranke ergeben ein ähnliches Bild. Dagegen zeigen alle Patienten mit Gesichtserysipel eine Erhöhung.

Das Material für andere Infektionskrankheiten ist leider zu gering, um zu sicheren Ergebnissen zu kommen — immerhin findet Grumke bei 3 Fällen von Polyarthrits rheumatica in einem Falle eine Erhöhung auf 128 E.; bei allen anderen angeführten Krankheiten liegt nur je ein Patient vor, so z. B. Lymphogranulomatose mit 128 E. und Abklingen auf 16 E. — Perityphlitis mit Leberabzess anfangs den höchsten Normalwert von 64 E., dann Anstieg auf 256 E. und wieder Absinken zum Ausgangswert — Masern mit 128 E. — Masernpneumonie mit 256 E. — Meningitis epidemica mit 32 E. — Meningitis purulenta mit 128 E.

Grumke findet keinerlei Zeichen für eine Pankreasschädigung; trotz Suchens nach solchen findet er weder Linkschmerzen, noch Fettstühle, noch Muskelfasern im Stuhl, noch eine pathologische Zuckerausscheidung, noch eine Head'sche Zone. Grumke bemüht sich, eine Erklärung für den Anstieg der Harndiastase zu geben, findet jedoch keine bestimmte Antwort. Er denkt daran, daß es sich um eine durch die Infektion hervorgerufene vermehrte Bildung handeln könne — oder daß die erhöhte Bildung durch den Reiz des beträchtlich gesteigerten Stoffabbaues in den Geweben hervorgerufen wird. Vielleicht wird die Bauchspeicheldrüse auch durch die Typhustoxine beeinflusst; beim Gesichtserysipel kann man an eine Schädigung oder Mitbeteiligung der Parotis denken.

Das Ergebnis bei Grumke ist also, daß sich bei einer Reihe von Infektionskrankheiten eine Erhöhung der Diastase findet — ausgesprochen und ganz sicher in allen Fällen von Gesichtserysipel und Typhus bzw. Paratyphus abdominalis. Und bei letzteren beiden Krankheiten ist die Höhe der Diastase von der Schwere der Krankheit abhängig.

Die 3 Fälle von Fleischvergiftung, die Kaczander²⁸⁾ anführt und bei denen er eine Vermehrung der Harndiastase bis auf 512 E. beobachtet hat, sind schon erwähnt, sollen aber der Vollständigkeit halber hier nochmals kurz angeführt worden sein.

Aus dem bisherigen geht schon hervor, daß man in der Bestimmung des Diaftafewertes in Harn und Blut keineswegs ein gutes und einfaches Hilfsmittel hat, um zur Diagnose einer Pankreasaffektion zu kommen oder eine solche auszuschließen.

Allerdings muß man bedenken, daß es sich ja bei jeder ernstesten Erkrankung nicht um das befallene Organ allein handelt, sondern daß immer der Gesamtorganismus mit ergriffen ist — und daß somit alle Organe und Zellen, die Diaftase zu erzeugen in der Lage sind, solche erhöht produzieren, was vor allem für die Bauchspeicheldrüse in Frage kommt, da diese in der Erzeugung obenan steht. Zwar ist sie nicht die alleinige Bildungsstätte für die Diaftase, aber wohl unbestritten die Haupterzeugungsstelle. Denn die Produktion seitens des Darmes ist so minimal, daß sie nicht ins Gewicht fällt. Etwas mehr Bedeutung dürften schon die Mundspeicheldrüsen haben — bekanntlich ist ja bei jeder Parotitis die Diaftase erhöht! — Und schließlich glaubt Reid⁵⁾ aus der Tatsache, daß bei seinen Versuchstieren weder Gangunterbindung, noch Pankreatektomie wesentlichen Einfluß auf die Blutdiaftase, wenigstens was die Dauer einer Veränderung anbetrifft, hatten, schließen zu dürfen, daß das Pankreas nicht die alleinige Quelle der Blutdiaftase ist — er ist der Ansicht, daß die Leberzellen die gleiche Fähigkeit haben, Diaftase zu bilden, sie dem Blute zuzuführen bzw. zu entreißen.

Bei der Gangunterbindung ist zu beachten, daß gar oft andere Gänge da sind, die nicht mitunterbunden wurden — aber das Gleichbleiben der Diaftafewerte nach Pankreatektomie gibt doch zu denken, wenngleich man Tierversuche nicht so ohne weiteres auf menschliche Verhältnisse übertragen darf.

Auch Falkenhaußen⁶⁾ glaubt aufgrund von vielen Tierexperimenten zu dem Schluß kommen zu können, daß die Leberzellen unter Umständen erheblich zur Diaftaseproduktion beitragen. Dabei ist es seiner Meinung nach nicht nur der Zerfall der Leberzellen durch die experimentell gesetzte Phosphorvergiftung, und das durch den Zerfall bedingte Freiwerden der Diaftase, sondern

er hält auch eine aktive Mehrproduktion der Leberzellen für gegeben. Wenn diese Beobachtungen auch für den Menschen zuträfen, so wäre das m. E., eine Erklärung für die bei Gallenleiden und Leberschädigungen so oft gefundene Diafaservermehrung, die also nicht nur allein Ausdruck für eine Stauung zu sein braucht, sondern eine aktive Mehrerzeugung darstellt.

Gewiß — bei jeder schwereren Erkrankung ist der Gesamtorganismus irgendwie beteiligt, folglich sind die Bildungsstätten der Diafase, ganz gleich um welche es sich handelt, irritiert, in einen Zustand höherer Reizbarkeit bzw. Anfälligkeit versetzt, aber damit brauchen sie doch noch lange nicht mitbeteiligt zu sein im Sinne der meisten der angegebenen Autoren, welche unter dieser „Mitbeteiligung“ eine mehr oder minder leichte Miterkrankung verstehen, die klinisch nicht ins Auge zu fallen braucht. Es genügt ja schon eine ganz geringe Affektion des vegetativen Nervensystems oder einzelner sekretionsfördernder Nerven, um die Sekretion in den einzelnen Organen weitgehend zu beeinflussen.

Zusammenfassendes über die Literatur.

Der Wert der Diafasbestimmung in Urin und Serum nach der Wohlgemuth'schen Methode ist von den meisten Autoren anerkannt. Nur wenige ablehnende Stimmen liegen vor, welche die Methode höchstens zur Stützung der aus anderen klinischen Untersuchungen gewonnenen Diagnose anwenden.

Vor allem ist da de Tullio³³⁾ zu nennen, der völlig unregelmäßige und abweichende Werte bekommt, aus denen er keine Schlüsse ziehen will — dann auch v. Redwitz³²⁾, dem die Methode nicht schnell und nicht zuverlässig genug ist. Für Felsenreich²²⁾ hat sie nur in den allerersten Stunden nach Krankheitsbeginn Bedeutung. Und daß Oehlecker²²⁾ und Stich²²⁾ sie nur zur Stützung der Diagnose, und auch dann nur selten heranziehen, wurde schon gesagt.

Diesen geradezu entgegengesetzt ist die Ansicht einer Zahl von anderen Verfassern, die in jeder mehr oder weniger ausgesprochenen Diafaservermehrung eine Erkrankung des Pankreas

sehen, entweder im Sinne einer akuten Pankreatitis oder Pankreasnekrose, oder bei weniger starker Erhöhung des Diastafewertes und bei Erkrankungen anderer Bauchorgane, im Sinne einer diese begleitenden leichten Pankreaschädigung (Stauung, Oedem usw.). Einige dieser Autoren sollen nochmals erwähnt werden, so z. B. J a n k e r¹¹⁾, v. S t r a f f e r¹⁰⁾, K r e c h¹⁴⁾, C o h n¹⁵⁾, M i k k e l s e n¹⁹⁾, D o u g l a s¹⁸⁾, R i n g d a l l²⁷⁾, P o p p e r²⁴⁾, R o s t²³⁾, S c h o r l e m m e r³¹⁾, R o l o f f¹²⁾, R o s t o c k²⁵⁾ u. a.

Einige Verfasser versuchen eine Erklärung für die Mitbeteiligung des Pankreas bei anderen Baucherkrankungen zu geben und glauben an Sekretstauung durch Kompression der Ausführungsgänge oder an Druck auf die Drüse selbst mit sekundärem Oedem usw. — aber nur ganz wenige versuchen, einen Beweis zu geben, z. B. T h o m s e n²⁶⁾, der aus dem Ausfall seiner Blutzuckerbelastungsproben bei Patienten mit septischer Appendicitis eine tatsächliche Pankreaschädigung ableiten zu können glaubt, wenngleich H i r s c h h o r n⁵²⁾ diesem anderen Verlauf der Blutzuckerkurve wenig Bedeutung beimißt. Oder D o d d s⁵⁶⁾, welcher bei Kindern mit Rachitis eine mangelhafte Fettsplaltung feststellt. Teilweise wird eine sekundäre Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse durch die Operation oder die Sektion bestätigt, was in der Aufstellung erwähnt worden ist.

Die meisten Autoren untersuchen den Diastafewert im Urin, einige dagegen ausschließlich im Blut, so v. S t r a f f e r¹⁰⁾, P o p p e r²⁴⁾ und R o s e n o⁴⁵⁾. Gegen die Blutuntersuchung sprechen sich J a n k e r¹¹⁾, R o l o f f¹²⁾, G e r m e r⁵⁸⁾ u. a. aus, denen der Harnwert sicherer und aufschlußreicher ist, falls nicht Nierenerkrankungen vorliegen.

Im Gegensatz zu den Autoren, die eine Diastasevermehrung auf eine Pankreaserkrankung zurückführen, finden einige Untersucher bei Erkrankungen anderer Organe, selbst solcher außerhalb der Nachbarschaft der Bauchspeicheldrüse, eine Erhöhung des Diastafewertes im Blut oder im Urin bzw. in beiden:

L o p p e r⁴⁴⁾ bei Cholelithiasis, ohne eine Mitbeteiligung des Pankreas anzunehmen;

Crandall⁵⁰⁾ im Blut bei multipler Sklerose und bei Leberschädigungen;

Sotgiu⁵¹⁾ bei Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege, sowie bei Ulcera;

Roseno⁴⁸⁾ im Blut bei Nierenschädigung;

de Tullio³³⁾, Meyers⁴⁰⁾ und Fuchs⁴¹⁾ im Blut bei Diabetes mellitus;

Wakefield⁴⁶⁾ bei Akromegalie;

Adam⁵⁵⁾ bei Rachitis; Koch⁵⁴⁾ bei Pfortaderthrombose; bei Parotitis von vielen Untersuchern, u. a. Wohlgemuth¹⁾, Sotgiu⁵¹⁾; und schließlich finden Garry⁵⁹⁾, Germer⁵⁸⁾ und Grumke⁶⁰⁾ höhere Werte bei allen möglichen Infektionskrankheiten.

Im Gegensatz zu der Erhöhung des Blutdiastafewertes bei Diabetes mellitus, die von de Tullio³³⁾, Meyers⁴⁰⁾ und Fuchs⁴¹⁾ angegeben wird, finden Ghedini⁴²⁾ eine Erniedrigung im Blut, v. Straffer¹⁰⁾ einen normalen Blutwert, Wohlgemuth¹⁾ eine Erniedrigung im Harn.

Einige Verfasser glauben einen Zusammenhang zwischen Blut- bzw. Harndiastafespiegel und der Schwere der Erkrankung zu sehen; entweder läuft die Erkrankung der Erhöhung oder aber der Erniedrigung des Diastafewertes parallel. Eine solche Abhängigkeit wird betont von Janker¹¹⁾, Kreh¹⁴⁾, Baumann⁸⁾ für Pankreaserkrankungen, Marino³⁷⁾ findet es für Diabetes mellitus, Grumke⁶⁰⁾ für seine Fälle von Parotitis, Gesichtserysipel und Typhus bzw. Paratyphus.

Ein solcher Zusammenhang, eine Abhängigkeit des Diastafewertes von der Schwere der Krankheit, von den anatomischen Veränderungen, von der Höhe des Fiebers usw. wird abgelehnt und bestritten von Roloff¹²⁾, Popper²⁴⁾, Bettoni⁴³⁾ und Germer⁵⁸⁾, welche das in ihren Arbeiten ausdrücklich erwähnen.

II. Die Untersuchungen der Medizinischen Universitätsklinik Bonn.

In der Medizinischen Universitätsklinik Bonn ist die Diafaste im Harn oder in beiden Medien nach der Original-Wohlgemuth-Methode, also ohne Zusatz einer Pufferlösung, nicht nur bei den verschiedensten Bauchbeschwerden, sondern auch bei einer Reihe anderer Krankheiten bestimmt worden. Dabei galt als normal ein Blutwert von 8 bis 16 E., als obere Grenze wurden 32 E. angenommen, als untere 4 E. Die entsprechenden Werte für den Harn sind normal 16 bis 32 E., obere Grenze sind hier 64 E., als untere Norm gelten 8 E.

Erscheinungen seitens des Pankreas.

In 19 Fällen, bei denen aus der Vorgeschichte oder aus dem klinischen Bild die Vermutung aufgetaucht war, daß eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse vorliegen könne, wurde die Diafaste bestimmt. Da die Fälle von Pankreaschädigungen oder Pankreaserkrankungen ja für den differentialdiagnostischen Wert der Diafastebestimmung besonders wichtig sind, sollen die Krankengeschichten kurz im Auszug wiedergegeben werden:

1. Fall. Elly K., 31 Jahre, V/1817/34—35.

Aus der Anamnese geht hervor, daß Patientin mit 15 Jahren mehrmals leichte Gallensteinkoliken gehabt hat. Im Mai 1934 treten kolikartige Schmerzen in der rechten Seite auf, die zum Rücken hin bis an das Schulterblatt ausstrahlen. Anfang Oktober 1934 wird die Patientin wegen Uterusverlagerung operiert; weil wiederum Gallensteinkoliken auftreten, wird im Anschluß daran im November 1934 die Gallenblase exstirpiert. Die Schmerzen bleiben aber danach in gleicher Stärke bestehen.

Bei der Aufnahme im November 34 besteht eine leichte Spannung sowie Druckschmerzhaftigkeit im Epigastrium; sonst normaler Organbefund.

Eine Leukocytose von 9800, eine leicht beschleunigte Senkung von 27¹/₅₂/90 weisen auf einen entzündlichen Prozeß hin; die

Druckschmerzhaftigkeit im Epigastrium und der Spontan Schmerz — alles nach Entfernung der Gallenblase! — lassen an die Bauchspeicheldrüse denken, zumal röntgenologisch am Magendarmkanal kein pathologischer Befund erhoben werden kann. Die Diagnose Pankreatitis wird gestützt durch die Diastasewerte und den prompten Behandlungserfolg:

3.	12.	34	Harn	1024 E.,	Blut	8 E.,
4.	12.	34	„	512 E.,	„	8 E.,
6.	12.	34	„	256 E.,		
7.	12.	34	„	64 E.,		
11.	12.	34	„	32 E.,		
12.	12.	34	„	32 E.,		

Dieses Ergebnis widerspricht anscheinend der Angabe, daß eine Vermehrung der Diastase nur kurz nach den ersten Schmerzanfällen zu finden sei. Man kann aber hier ganz gut annehmen, daß es sich um einzelne akute Schübe gehandelt hat. Das deckt sich dann völlig mit der Auffassung Felsenreich's²²⁾, der ja, wie früher schon erwähnt, am entschiedensten eine möglichst frühe Diastasebestimmung verlangt, und der das Hochschnellen des Diastasewertes bei jedem Anfall von Linkschmerz bei seinen Patienten bestätigt findet. Die Angabe der Patientin, „Gallensteinkoliken“ gehabt zu haben, dürfte wohl dahin zu berichtigen sein, daß es sich anfangs vielleicht um Gallensteinkoliken gehandelt hat, daß die Schmerzanfälle später wohl aber durch die Bauchspeicheldrüse bedingt waren, die von der Patientin wegen der Ähnlichkeit mit den früheren Attacken fälschlicherweise auf die Gallenblase bezogen wurden. Die Angabe, daß es nach der Gallenblasenextirpation „die gleichen Schmerzen wie früher“ waren, spricht entschieden für eine solche Annahme.

Das Ergebnis der Diastasebestimmung entspricht den Erwartungen, denn der Wert deckt sich mit der aus den klinischen Untersuchungen gefundenen Diagnose.

2. Fall. Helene H., 55 Jahre.

Am 7. 10. 1936 wird Patientin eingeliefert mit der Diagnose „akute Pankreatitis“.

Aus der Familienanamnese geht hervor, daß die Mutter mit 65 Jahren an Magen-Ca. gestorben ist. Die Patientin selbst ist immer gesund gewesen.

Im März dieses Jahres hatte sie einen ähnlichen Zustand wie jetzt. Am 5. 10. 36 bekam sie am Nachmittag bei der Feldarbeit ganz plötzlich heftigste Schmerzen in der Magen- und der rechten Nierengegend. Sie konnte, auch nachdem sie nach Hause gegangen war und sich ins Bett gelegt hatte, nicht richtig durchatmen vor Schmerzen. Sie hatte starken Brechreiz. Vom Arzt bekam sie eine Spritze, worauf sie Linderung verspürte und sogar etwas schlafen konnte. Am nächsten Tage waren die Schmerzen etwas weniger heftig. Es bestand völlige Stuhl- und Windverhaltung. Am 3. Tage besserte sich der Zustand soweit, daß Patientin transportfähig war und in die Medizinische Klinik eingeliefert werden konnte.

Dort wurde sofort neben flüchtiger Untersuchung der inneren Organe und genauer Lokaluntersuchung die Diastase bestimmt, die im Blut 32 E., im Harn 1024 E. ergab. Es bestand diffuse leichte Bauchdeckenspannung bei der noch immer etwas benommenen Patientin, daneben Druckschmerzhaftigkeit im ganzen Oberbauch, besonders ausgeprägt in der Mittellinie oberhalb des Nabels. Handbreit über dem Nabel, nach links bis zur Milz ziehend, besteht Klopfschmerzhaftigkeit. In der Bauchhöhle ist etwas freies Exsudat nachweisbar. Nach Rücksprache mit dem Chirurgen wird Patientin nach kaum einstündigem Aufenthalt in der Medizinischen Klinik zur Chirurgischen Klinik verlegt. Dort wird sie konservativ behandelt und nach einiger Zeit geheilt entlassen. Die Diastasewerte während der ersten Tage waren:

	H a r n	B l u t
7. 10. 36	1024 E.	32 E.
8. 10. 36	512 E.	
9. 10. 36	128 E.	
10. 10. 36	64 E., Kontrollglas	32 E.
11. 10. 36	64 E.	

An der Diagnose akute Pankreatitis ist nach der Anamnese mit dem typischen plötzlichen Beginn der äußerst heftigen Schmerzen, dem schweren Krankheitsbild — Patientin ist am dritten Tag

noch etwas benommen! — der Druckschmerzhaftigkeit im Oberbauch bei nur ganz geringer Bauchdeckenspannung nicht zu zweifeln — wenngleich die Spontanschmerzen nicht nur in der linken Oberbauchgegend lokalisiert waren, sondern zeitweise mehr allgemein im Oberbauch auftraten und sogar rechts angegeben wurden.

Man kann dabei gut an eine hauptsächliche Lokalisation der Erkrankung im rechts von der Mittellinie gelegenen Pankreaskopf denken, dann aber auch vor allem an eine gleichzeitige Affektion der Gallenblase oder der Gallenwege — wie ja Schorlemmer³¹⁾ gefunden hat, daß bei Operationen wegen Pankreaserkrankungen in weitaus den meisten Fällen Gallenblase oder Gallenwege mitbeteiligt sind. Wie schon erwähnt, hält er diese Gallensystemerkrankung für das Primäre und die Pankreatitis erst für eine Folge davon, auch wenn sie völlig das Bild beherrscht.

3. Fall. Dr. G., 34 Jahre, V/207/35—36.

Am Tage vor der Aufnahme plötzlich starkes Erbrechen mit heftigen Schmerzen im Rücken und mäßigeren Schmerzen diffus im Leib. Die Haut ist leicht gelblich verfärbt. Die Schmerzen halten auch am nächsten Tage an, haben keinen kolikartigen Charakter. Der Stuhl ist hellgelb; Stuhl und Winde werden zurückgehalten.

Bei der Aufnahme fühlt Patient sich sehr müde und matt. Es wird geringer Spontan- und Druckschmerz diffus im Unterleib angegeben, die Bauchdecken sind nicht gespannt, eine Resistenz ist nicht zu tasten. Die Senkung ist mit $5/9$ normal, die Leukocyten sind auf 12 000 vermehrt, im weißen Blutbild ist eine deutliche Linksverschiebung zu merken mit 16% Stabkernigen.

Die sofort vorgenommene Diastasebestimmung ergibt im Blut den Wert von 128 E. und ist im Harn mit 32 E. normal. Dies zusammen mit dem schnellen Verfall, dem fahlen ikterischen Aussehen des Patienten läßt die Diagnose akute Pankreasnekrose zu. Die in der Chirurgischen Klinik vorgenommene Operation bestätigt die Diagnose: das Pankreas ist in eine blutige Masse verwandelt. Nach der Operation steigt der Blutzucker auf 139 mg% an, die Diastase bleibt in Harn und Blut bei 32 E.; unter zunehmender Somnolenz, Delirien usw. tritt schließlich nach einigen Tagen der Tod ein.

Daß nach der Operation der Blutwert wieder zur Norm zurückfällt, hat seinen Grund darin, daß nun das Pankreassekret nicht mehr frei in die Bauchhöhle gelangt, von wo aus es ins Blut reabsorbiert wird, es wird vielmehr durch die Drainage nach außen hin abgeleitet.

Bei 2 Fällen von akuter Pankreasnekrose, bei denen R o f e n o ⁴⁵⁾ erniedrigte Werte als Zeichen der weitgehenden bzw. totalen Zerstörung des Parenchyms gefunden hatte, lagen die Verhältnisse insofern anders, als die intakte Drüsenkapsel das Pankreassekret am Austritt in die freie Bauchhöhle hinderte. In unserem Falle ist das aber nicht so gewesen, denn bei der Operation sind auf dem Netz die typischen weißen „Kalkspritzer“ zu sehen, Nekroseschäden durch die ausgetretenen Fermente.

Auch in diesem Falle konnte die Diastasebestimmung mit dem deutlich erhöhten Blutwert die klinisch gewonnene Diagnose stützen.

4. Fall. Richard F., 20 Jahre.

Im Herbst 1928 und 1932 macht Patient wegen Ulcus duod. je eine Diätkur zu Hause durch. Im August 1933 wird in einem Krankenhaus wegen dieses Ulcus duod. eine vordere Gastro-Enterostomie gemacht. Kurz nach der Operation treten Fettstühle auf, eine langsame, aber dauernd fortschreitende Gewichtsabnahme macht sich bemerkbar. Fett, Milch und Mehl, und von Medikamenten Pankreon werden nicht vertragen. Die Beine sind geschwollen.

Ende Februar 1934 wird Patient in sehr schlechtem Kräfte- und Ernährungszustand eingeliefert. Die inneren Organe zeigen normalen Befund.

Diastase am 1. 3. 1934 Blut 8 E., Harn 16 E.,

3. 3. 1934

Stuhl 10

10. 3. 1934 Blut 16 E., Harn 32 E.,

22. 3. 1934 Blut 16 E., Harn 16 E.,

23. 3. 1934

Stuhl 40

Im Stuhl finden sich Muskelfasern. Noch immer treten Fettstühle auf, die Abmagerung schreitet fort, das Aussehen wird immer anämischer.

All dies führt immer mehr zu der Annahme einer äußeren Pankreasinsuffizienz, trotzdem normale Diastasewerte vorliegen.

Nach Besserung des Kreislaufs durch Digitalis gehen die Oedeme zurück, und der Patient wird zur Chirurgischen Klinik verlegt. Dort wird eine Probelaparatomie gemacht, und es zeigt sich, daß bei der Operation im Herbst irrthümlicherweise eine Anastomose zwischen dem Magen und einem Meckel'schen Divertikel angelegt worden ist. Es wird eine Resektion nach Billroth II oralis totalis antekolika mit Braun'scher Anastomose vorgenommen.

Patient bekommt eine postoperative Pneumonie im rechten Unterlappen und Empyem. Nach Punktion und Heberdrainage langsame Besserung des auch durch Kreislaufinsuffizienz bedrohlichen Zustandes.

Irgendein Zeichen für eine „chronische Pankreasinsuffizienz“, die ja auf Grund des typischen klinischen Bildes vor der Operation angenommen worden war, läßt sich jetzt nicht mehr finden, nachdem die Operation bessere Verhältnisse für die Ausnutzung der Nahrung geschaffen hat.

Der Diätafewert, schon vorher normal, ist es mit 8 E. im Serum und 8 E. im Harn auch jetzt. Im Stuhl werden dagegen die vorher aufgetauchten Muskelfasern und das Fett nicht mehr gefunden. Patient wird nach einiger Zeit geheilt entlassen.

Trotz der Zeichen einer „äußeren Pankreasinsuffizienz“ — Fettstühle, Muskelfasern im Stuhl, Abmagerung — ist die Bauchspeicheldrüse völlig in Ordnung. Es hat sich einzig und allein um die äußerst mangelhafte Ausnutzung der Speisen, vor allem der fetten und eiweißreichen, gehandelt. Die Diätafewert deckt sich also auch diesmal mit dem wirklichen der Erkrankung zugrunde liegenden Befund.

5. Fall. Theo G., 42 Jahre, V/III 8/35—36.

Seit einem Monat hat der Patient dauernd Schmerzen in der Magengegend und im Rücken, besonders links, die nachts stärker auftreten. Dazu kommen Brechreiz und Erbrechen, sowie starke Gewichtsabnahme in kurzer Zeit.

Patient wird in schlechtem Ernährungs- und Kräftezustand eingeliefert. Im Leib ist zwischen Processus xiphoides und Nabel eine handtellergroße, derbe Resistenz zu fühlen, die sich bei der Atmung nicht verschiebt und auch nicht gegen die Umgebung ab-

zugrenzen ist. Die Probelaparatomie in der Chirurgischen Klinik ergibt ein inoperables Pankreaskarzinom mit Metastasen an der kleinen Curvatur des Magens. Es bildet sich ein allmählich zunehmender Ascites, der zweimal punktiert wird. Unter zunehmender Kachexie erfolgt am 12. 12. 35 der Exitus.

Die Diafatafenwerte waren:

11. 10. 35 Harn 16 E.,

14. 10. 35

Serum 16 E.,

15. 10. 35 Harn 32 E.,

Ascites 8 E.,

4. 11. 35

Ascites 8 E.

Sie sind also völlig normal.

Die Erhöhung des Diafatafewertes, die man bei dem ausgesprochenen Pankreasbefund hätte vermuten können, bleibt hier aus. Auch die Beobachtung von Elmann¹⁷⁾, der eine deutliche Erniedrigung der Diafatafe bei Pankreaskarzinom findet, wird nicht bestätigt. Den normalen Wert kann man dabei aber gut mit der Ansicht von Heiberg²⁾ und der von Schnitzler²²⁾ erklären: Restdrüsen machen den Ausfall der durch den Krebs zerstörten Drüsenteile durch Mehrproduktion wett.

Dann muß man auch bedenken, daß es sich hier um eine immerhin sehr chronisch verlaufende Erkrankung handelt — und viele Autoren finden bei einer solchen ja normale Diafatafewerte, z. B. Graßberger²⁰⁾, Skoog⁹⁾, Felsenreich²²⁾ u. a.

6. Fall. Katharina G., 66 Jahre, V/1296/34—35.

Mit 16 Jahren Lungentuberkulose links oben. Vor 6 Jahren wird Zucker festgestellt, im November 1931 wird Patientin wegen Hydrops der Gallenblase operiert. Nach der Operation treten unterhalb des linken Rippenbogens starke Schmerzen auf, dazu stellt sich Erbrechen ein. Die Stuhlverhältnisse während dieser Zeit sind nicht erinnerlich. Im September 1932 treten wieder solche Schmerzanfälle mit heftigem Erbrechen auf. Im Mai 1933 hat Patientin am linken Arm Knochentuberkulose mit wahrscheinlicher leichter Sepsis, sowie Cystitis und Hyperglykaemie. Kurz vor Einlieferung in die Klinik hat Patientin wieder äußerst heftige, angeblich kolikartige Schmerzen unter dem linken Rippenbogen, die gürtelförmig in den Rücken bis zur Wirbelfäule ausstrahlen. Dazu

kommen Erbrechen, Schüttelfrost und Temperatur von $40,3^{\circ}$ C. Danach dauernd dumpfe Schmerzen im Oberbauch, Druckgefühl in der Magengegend, Herzklopfen und Luftmangel, ausgesprochene Nachtschweiß, geringer Husten mit etwas Auswurf. Auch klagt sie über geschwollene Füße, starken Durst und Hautjucken.

Am 15. 9. 1934 ergibt sich folgender Befund:

Oedem der beiden unteren Extremitäten, Foetor ex ore, über beiden Lungen teilweise Schallverkürzung und verschärftes Atemgeräusch, Kyphoskoliose der Hals- und Brustwirbelsäule. Am Herzen lautes, systolisches Geräusch über allen Ostien, der II. Pulmonalton ist lauter als der II. Aortenton. Am Leib ist Druckschmerz links vom Nabel dicht unter dem linken Rippenbogen festzustellen. Im Harn ergibt sich ein Diastafewert von 16 E. Die BKS. beträgt nach Westergreen $30/62/110$. Nach Schmidt'scher Probekost finden sich Fett-Tropfen und Muskelfasern im Stuhl, die Lipase im Serum und im Urin ist vermehrt, was zur Diagnose chronische Pankreatitis führt. Harnzucker findet sich nicht, der Blutzucker geht nie über $100 \text{ mg\%}$ hinaus. Der Verdacht auf Diabetes mellitus, der nach der Anamnese aufgetaucht war, bestätigt sich also nicht. Die Oedeme gehen auf Digitalis gut zurück.

An der Diagnose auf akuten Anfall einer chronischen Pankreatitis ist nach Vorgeschichte und Befund nicht zu zweifeln. Denn die heftigen Schmerzen unter dem linken Rippenbogen — während rechts keine Schmerzen auftreten — das gürtelförmige Ausstrahlen derselben in den Rücken, besonders das Aufhören an der Wirbelsäule, das schwere, plötzlich einsetzende Krankheitsbild, weisen auf einen akuten pankreatitischen Anfall hin. Der Druckschmerz links vom Nabel unter dem linken Rippenbogen kann verschieden gedeutet werden, wenngleich er nach Heiberg²¹⁾ und nach Norman²²⁾ stark für Pankreatitis spricht. Aber der Befund von Fett-Tropfen und Muskelfasern im Stuhl nach Schmidt'scher Probekost, sowie die Vermehrung der Lipase in Harn und Serum weisen auf eine Pankreaschädigung hin. Für diese spricht auch der Anstieg des Blutzuckers nach Zuckerbelastung. Es ist derselbe Versuch, den Thomson²⁶⁾ angestellt hat, um zu zeigen, daß bei seinen Patienten mit septischer Appendicitis die Bauchspeicheldrüse tatsächlich

mitbeteiligt war. In unserem Falle ist nun der Diastafewert im Harn mit 16 E. völlig normal, obwohl alle Voraussetzungen für eine Erhöhung eigentlich gegeben sind, sogar die Forderung Fellenreich's²²⁾, daß die Diastasebestimmung kurz nach den ersten akuten Erscheinungen vorgenommen werden müsse.

Der Fall kommt aber der Anschauung von Graßberger²⁰⁾ ziemlich nahe, der ja bei neuen akuten Schüben eines chronisch geschädigten Pankreas keine neuerliche Diastaseerhöhung findet.

Man könnte bei dieser Patientin vermuten, daß die Pankreasschädigung durch die Operation gesetzt worden ist — eine Möglichkeit, die von Foged²⁹⁾ erwähnt wird, und die auch Ringdall²⁷⁾ in etwa einem Drittel seiner Laparatomien findet. Allerdings stellen diese dabei eine Erhöhung des Diastafewertes fest, welche hier fehlt, obwohl an der Pankreasschädigung kaum gezweifelt werden kann.

Dieser Fall bildet einen Gegensatz zu den Anschauungen von Janker¹¹⁾, Roloff¹²⁾, Douglas¹⁸⁾, Mikkelsen¹⁹⁾ u. a., welche bei normalem Diastafewert bei Baucherkrankungen eine Pankreasschädigung ausschließen.

7. Fall. Anna B., 45 Jahre, IX/79/35—36.

Seit 1½ Jahren hat Patientin Anfälle von krampfartigen Schmerzen, die im Rücken beginnen und in den Leib ausstrahlen. Nach fetten Speisen bekommt sie starken Durchfall. In der letzten Zeit hat Patientin erheblichen Gewichtsverlust bemerkt.

Sie wird in reduziertem Ernährungs- und Kräftezustand eingeliefert. Der Leib ist stark aufgetrieben, in der Pankreasgegend wird Druckschmerz angegeben, Abwehrspannung besteht nicht. Die Temperatur ist leicht erhöht, die Senkung der roten Blutkörperchen nach Westergreen ein wenig beschleunigt. Der ausgeheberte Magen saft ergibt anazide Säurewerte. Die Pankreasfunktionsprüfung nach Traugott und Staub ergibt eine zweigipflige Kurve, nach Schmidt'scher Probekost finden sich im Stuhl vereinzelt Muskelfasern — bei der ersten Untersuchung ist im Serum Pankreaslipase nach Roß festzustellen. Der sonstige Befund ist in Ordnung.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose wird neben leichter hypazider Gastritis auf chronische Pankreatitis gestellt, obwohl die

Diaftafewerte mit 8 E. im Serum und 8 E. im Harn im Bereiche des Normalen liegen — im Harn fogar an der unteren Grenze. Auch bei der Nachprüfung 10 Tage fpäter ergibt ſich im Serum der Normalwert von 16 E.

Heiberg²⁾, Roloff¹²⁾, Felfenreich²²⁾ u. a. betonen den Abfall zu normalen Werten bei längerer Krankheitsdauer. Nur wenige Verfaſſer finden auch bei chroniſcher Pankreatitis erhöhte Werte, Popper²⁴⁾ gehört zu dieſen.

Die Diagnose auf chroniſche Pankreatitis dürfte m. E. zu Recht geſtellt ſein, wenn man die Symptome bedenkt. Der Druckſchmerz im linken Oberbauch ohne Abwehrſpannung weiſt ſtark auf die Bauchſpeicheldrüse hin. Die leicht beſchleunigte Senkung und die etwas erhöhte Temperatur können zwar auch durch die Gaſtritis bedingt ſein, jedoch kann man mit dem gleichen Rechte auf das Pankreas ſchließen, vielleicht können beide Affektionen angeſchuldigt werden. Für Pankreatitis ſpricht auch die Tatſache, daß fette Speiſen nicht vertragen werden, obwohl normale Gallenverhältniſſe vorliegen, denn dauernd treten zahlreiche und vor allem breiige Stühle auf.

Dann deuten die Muskelfaſern im Stuhl nach Schmidt'scher Probekoft ſowie die bei der erſten Unterſuchung gefundene Pankreaslipase im Serum auf eine Affektion der Bauchſpeicheldrüse hin. Und für eine ſolche ſpricht auch der Ausfall der Blutzuckerbelastungskurve mit ihren 2 Gipfeln.

Der wahrſcheinliche Grund für den normalen Diaſtafewert iſt ſchon angegeben.

8. Fall. Johann R., 46 Jahre, X/1115/35—36.

Patient iſt in Behandlung wegen Nephritis nach chroniſcher Tonſillitis und Pharyngitis. Aus der Anamnese geht hervor, daß er vor etwa 14 Jahren eine Gallenblaſenentzündung gehabt hat.

Während des Aufenthaltes in der Klinik bekommt er plötzlich heftige Schmerzen im linken Oberbauch, die zum Rücken hin ausſtrahlen, nicht kolikartig ſind, keine Bauchdeckenspannung. Temperatur iſt unverändert, ebenſo das Blutbild, jedoch iſt eine Head'sche Zone nachzuweiſen. Stuhl dünn, wird oft entleert, etwas Fett darin, aber keine Muskelfaſern. Aus dieſen Symptomen wird auf eine

Pankreatitis geschlossen. Sie klingt in wenigen Tagen völlig wieder ab. Die Diastafewerte waren während dieser Zeit:

31. 8. 35 Serum 16 E., Harn 8 E.,

6. 9. 35 Serum 16 E., Harn 32 E.,

Also ein Fall, der bei typischen Pankreasymptomen einen normalen Diastafewert aufweist.

9. Fall. Elisabeth P., 40 Jahre.

Aus der Anamnese geht hervor, daß Patientin in den Jahren 1927 und 1929 mehrere starke Schmerzanfälle im Leib gehabt hat, die vom behandelnden Arzt als Nierensteinkoliken gedeutet wurden. Vor 1 Jahr treten wieder solch starke Schmerzattacken auf, die im linken Oberbauch beginnen und über den ganzen Leib ausstrahlen.

Bei der Aufnahme Ende 1932 sind die inneren Organe ohne Befund. Unter dem linken Rippenbogen wird Druckschmerz angegeben. Durch die adipösen Bauchdecken ist ein fast kindskopfgroßer, harter, gegen die Haut verschieblicher Tumor zu tasten. Da keinerlei Abwehrspannung der Muskulatur zu merken ist, wird der Verdacht auf die Bauchspeicheldrüse gelenkt — und röntgenologisch läßt sich der Tumor gut gegen Magen, Kolon und Milz abgrenzen sowie einen Zusammenhang mit den Nieren unwahrscheinlich machen.

Der Blutdiastafewert beträgt 32 E., liegt also an der oberen Grenze der Norm.

Es wird die Diagnose auf Pankreascyste gestellt und die Cyste punktiert. Im Punktat beträgt der Diastafewert 8 bis 16 E.

Obwohl eine Affektion des Pankreas vorliegt, haben wir einen Diastafewert, der nicht erhöht ist, wenngleich er an der oberen Grenze der Norm liegt. Allerdings steht dieser Fall in einem gewissen Gegensatz zu der Veröffentlichung von E l m a n ¹⁷⁾, der bei Pankreascyste einen hohen Diastafewert gefunden hat.

10. Fall. Johann H., 46 Jahre.

Patient leidet seit 3 Monaten an starkem Durst, hochgradiger Müdigkeit und Mattigkeit. Vom Hausarzt wird Zucker festgestellt. Hinzu kommt ein ausgesprochener Icterus, weshalb Patient in die Klinik eingeliefert wird. Aus dem gesamten klinischen Bild, das bei

der klaren Diagnose nicht gebracht werden soll, wird trotz des normalen Diastafewertes mit 8 E. im Serum und 16 E. im Harn, bei der Kontrolle 32 E. im Harn, auf einen Pankreastumor geschlossen, der nicht nur die Bauchspeicheldrüse selbst — Diabetes als Folge der Störung der innersekretorischen Funktion — sondern auch die Pankreasausführungsgänge — Serum-Lipase nach Rona stark positiv — und die Gallenwege erfaßt — Bilirubingehalt des Blutes 9,0 bzw. 13,6 mg%. Die Diagnose wird bei der Operation in der Chir. Klinik bestätigt. Es liegt also der Fall vor, daß bei einer erheblichen Erkrankung des Pankreas sich völlig normale Diastafewerte finden.

11. Fall. Elise N., 33 Jahre.

Patientin gibt an, nie ernstlich krank gewesen zu sein. 1933 treten während der 3. Gravidität vorübergehende Schmerzanfälle im rechten und auch im linken Oberbauch mit Erbrechen auf. Sechs Wochen nach gut verlaufener Geburt plötzlich heftige Schmerzen im linken Oberbauch mit schwerer Störung des Allgemeinbefindens. Pat. wird mit der Diagnose „akute Pankreatitis“ eingeliefert und sofort am 1. 12. 1933 operiert, wobei die Diagnose bestätigt wird.

Im Laufe des Jahres 1934 litt Pat. unter zunehmendem Durstgefühl, desgleichen unter quälendem Hautjucken. Im November 1934 wurde ein Diabetes mellitus festgestellt. Seitdem in Behandlung der Ambulanz.

Ende Oktober 1936 treten plötzlich die gleichen Schmerzanfälle wie vor der Operation im Dezember 33 auf. Sie sind bald heftiger, bald lassen sie etwas nach, sodaß Pat. sich erst nach 14 Tagen von der Ambulanz einweisen läßt.

Pat. befindet sich in gutem Allgemeinzustand, am ganzen Körper sind Kratzeffekte zu sehen. Die inneren Organe zeigen normalen Befund. Zwischen Nabel und Schwertfortsatz eine 7 cm lange, reizlose Laparatomienarbe.

Röntgenaufnahme und Durchleuchtung zeigen Hypersekretion des Magens und periduodenitische Verwachsungen. Der Blutzuckerspiegel beträgt 230 mg%, im Urin ist etwas Eiweiß sowie vor allem 3,5%, 2,1% und später wieder 3,5% Zucker nachzuweisen.

Der Diaftafewert beträgt:

13. II. 36: Urin 8 E.,

16. II. 36: Blut 4 E.,

18. II. 36: Urin 16 E.

Fett und Muskelfafern werden selbst nach Fleischnahrung nicht gefunden — es liegt also neben der inneren keine äußere Pankreasinsuffizienz vor.

An einem Anfall von akuter Pankreatitis ist nach der typischen Schmerzanamnese und dem klinischen sonstigen Befund nicht zu zweifeln. Daß die Diaftafewerte trotzdem normal sind, deckt sich in diesem Falle mit den Ergebnissen von Graßberger²⁰⁾; dieser findet bei einem akuten Anfall keine neuerliche Diaftasevermehrung, wenn eine chronische Pankreaschädigung vorliegt oder wenn in der Anamnese eine Pankreatitis vorausgegangen ist. Graßberger erklärt diese Tatsache damit, daß die Bauchspeicheldrüse dann nicht mehr wie beim pankreasgefunden Menschen auf eine neue akute Schädigung mit einer erhöhten Diaftaseausscheidung zu antworten in der Lage ist. Dieser Fall bildet aber einen Gegensatz zu den Anschauungen einiger anderer Autoren, die bei jedem neuen Anfall eine Diaftasevermehrung finden. Ich erwähne hier nur Janker¹¹⁾ und Felfenreich²²⁾. Man kann auch denken, daß der Diaftafewert schon wieder abgeklungen ist, da die Pat. ja erst einige Zeit nach dem ersten Schmerzanfall eingeliefert wird. Felfenreich²²⁾ und vor allem Skoog⁹⁾ fordern die Untersuchung in den ersten Stunden, Skoog in den ersten 1—1½ Tagen.

12. Fall. Matthias Cl., 70 Jahre.

Hier werden unbestimmt lokalisierte Beschwerden im Oberbauch angegeben, wozu noch Icterus kommt. Klinisch findet sich eine scharf umschriebene Druckempfindlichkeit im linken Oberbauch, die dem Pankreas entspricht, eine Bilirubinaemie von 0,8 und 1,2 mg%. Außer den Zeichen innerer Pankreasinsuffizienz mit mittlerem Diabetes mellitus sind auch solche äußerer Pankreasinsuffizienz vorhanden: Die Serumlipase nach Rona ist positiv, nach Schmidt'scher Probekost treten im Stuhl Muskelfafern und Fettäurekristalle auf. Während die Muskelfafern mehr für das Pankreas sprechen, können die Fettäurekristalle auch auf den Verschuß der

Gallenwege und der durch den mangelnden Gallegehalt der Verdauungsflüssigkeit bedingten schlechteren Fettverdauung bezogen werden.

Die Diafatafewerte im Serum mit 8 E. und im Harn mit 32 E. sind völlig normal, obwohl nach dem ganzen klinischen Bild nicht an einer Pankreaserkrankung, zum mindesten nicht an einer ausgesprochenen Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse bei einer Erkrankung der Gallenwege gezweifelt werden kann.

13. Fall. Johann W., 38 Jahre, IX/2013/34—35.

Auch hier liegt ein ziemlich schwerer Pankreasdiabetes vor, zu dem noch Zeichen äußerer Insuffizienz hinzukommen.

Aus der Anamnese geht hervor, daß Pat. 1916 im Felde starke Durchfälle von braunem Aussehen und oft mit Blutbeimengungen gehabt hat. Seit dieser Zeit sei der Stuhl nicht mehr fest geworden, sondern immer breiig, hell und übelriechend gewesen.

Vom Mai bis September 1935 im Johanniterkrankenhaus wegen Cholangitis und Fettstühlen. Damals seien auch Durst, Mattigkeit und Gewichtsabnahme hinzugekommen, im Harn wurde Zucker festgestellt.

1927 wegen Trunksucht Aufnahme in die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt, Entziehungskur und Stellen unter Pflegerschaft.

Seitdem fast jedes Jahr 2—3 mal Aufnahme in die Med. Klinik wegen präkomatöser Zustände — Pat. hielt angeblich wegen wirtschaftlicher Gründe Diät nicht ein und spritzte nicht regelmäßig Insulin — oder wegen der Beschwerden durch die äußere Pankreasinsuffizienz: dauernd starke Durchfälle, 10—15 mal am Tage mit typischen Pankreasfettstühlen, heftige Leibschmerzen, trotzdem er angeblich bis zu 10 Pankreontabletten einnimmt.

1930 fällt die Wassermann'sche Reaktion im Serum stark positiv aus, während sie vorher nur zweifelhaft positiv gewesen war. Nach Hg-Schmierkur und Jodkalikur ist sie wieder zweifelhaft positiv.

Verschiedentlich bei den Aufnahmen noch Pat. stark nach Alkohol.

Der Blutdiafatafewert bei diesem Pat. ist mit 16 E. normal. Dagegen zeigt er im Harn bei verschiedenen Bestimmungen eine aus-

gesprochene Erniedrigung auf 2 E. Es kann nicht sicher entschieden werden, welcher Genese die der äußeren und inneren Pankreas-Insuffizienz zugrundeliegende Krankheit ist.

Den Alkoholismus kann man ebenfогut wie eine luetische Affektion anschuldigen.

14. Fall. Karl H., 45 Jahre, Bierbrauer, IX/1389/32—33.

Dieser Patient leidet an einem mittleren bis schweren Diabetes. Daneben treten auch bei ihm Zeichen äußerer Pankreasinsuffizienz auf: Tonstühle, stinkende Diarrhoen, Fett- und Muskelfasern im Stuhl. Die Erkrankung ist hier eindeutig auf reichlichen Alkoholgenuß zurückzuführen, wie aus der Anamnese hervorgeht. Der Blutdiastafewert beträgt 8 E.

15. Fall. Katharina R., 53 Jahre, IV/167/35—36.

Bei dieser Patientin besteht nur ein ganz leichter Pankreasdiabetes, der eigentlich erst nach Kohlehydratbelastung als solcher in Erscheinung tritt. Daneben besteht noch eine leichte Gastritis mit Achylie. Die Pat. kommt, weil sie mehrere heftige Schmerzanfälle im rechten Oberbauch gehabt hat. Die Senkung ist beschleunigt auf 21⁴/₁/59; die Leukocyten sind auf 8200 angestiegen; ein pathologischer Organbefund läßt sich jedoch außer der oben erwähnten Gastritis nicht erheben.

Der Diastafewert ist im Blut nicht bestimmt worden, liegt im Harn an der unteren Grenze von 8 E.

16. Fall. Katharina B., 60 Jahre, IX/1094/35—36.

Seit 1925 treten periodenweise Magenschmerzen auf mit faurem Aufstoßen und Sodbrennen, niemals ist Erbrechen dabei. Es besteht Widerwille gegen Fett und vor allem gegen Fleisch. In den letzten Monaten merkt Pat. starke Gewichtsabnahme. Sie wird in kachektischem Zustand mit cyanotischer Verfärbung der Lippen eingewiesen. Ein Tumor ist im linken Oberbauch nicht zu tasten, obwohl dort Druckschmerz angegeben wird. Die BKS. beträgt 40/80/118. Nach Schmidt'scher Probekost treten im Stuhl Fett und Muskelfasern auf. Die Durchleuchtung und Röntgenaufnahme lassen eine einwandfreie Beurteilung leider nicht zu.

Die Diastafewerte sind am 30. 8. 1935 im Serum 16 E., im Harn 8 E., hier liegt der Wert also an der unteren Grenze.

Aus dem Alter, der beschleunigten BKS. und der Gewichtsabnahme wird auf eine maligne Neubildung geschlossen, die wahrscheinlich dem Pankreas angehört, da von seiten des Magen-Darmkanals und der Gallenblase keine Beschwerden vorliegen, und da sich typische auf die Bauchspeicheldrüse hinweisende Symptome finden: Druckschmerz im Oberbauch links, mangelhafte Fett- und Fleischverdauung. Der Ausfall der Blutzuckerbelastungsprobe:

nüchtern 98mg%, nach 100 g Traubenzucker p. o.:

$\frac{1}{4}$ h 198 mg%

$\frac{1}{2}$ h 264 mg%

$\frac{3}{4}$ h 220 mg%

1 h 184 mg%

2 h 161 mg%

3 h 90 mg%

4 h 80 mg%,

zeigt zwar einen geringen Ausschlag über die Norm, der aber noch nicht als pathologisch bezeichnet werden kann — die innere Sekretion der Bauchspeicheldrüse scheint in Ordnung zu sein.

Eine genaue Diagnose hat sich leider nicht stellen lassen.

17. Fall. Barbara Schl., 64 Jahre.

1905 und 1931 typische Gallensteinkoliken. Seit Oktober 1932 treten starke Schmerzen in der Magengegend auf, meist etwa eine Stunde nach dem Essen, die nach links ausstrahlen. Der Stuhl ist unregelmäßig, oft schwarz gefärbt.

Am Leib ist bei Palpation keine Abwehrspannung zu merken, in der Magengegend wird Druckschmerz geäußert. Die Leber ragt 4 Querfinger unter dem Rippenbogen hervor, ist hart. Die BKS. beträgt 2/6/35, ist also normal; dasselbe gilt vom Blutzucker, der 115 mg% beträgt. Es besteht eine leichte Leukocytose von 7200. Nach Schmidt'scher Probekost finden sich im Stuhl einige Muskelfasern, aber kein Fett und keine Stärke. Die Diastasebestimmung ergibt folgende Werte:

3. 11. 32 Harn 4 E., Blut 4 E.,

8. 11. 32 Harn 4 E., Blut 4 E.,

also eine deutliche Verminderung vor allem im Harn. Klinisch und röntgenologisch ergibt sich keinerlei Anhaltspunkt für eine Magen-

Darmaffektion. Wegen dem Alter und der Gewichtsabnahme wird die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf Pankreastumor, der auch die Leber oder die Gallengänge ergriffen hat, gestellt und Operation angeraten. Leider hat Patientin sich nicht operieren lassen, sodaß eine sichere Bestätigung der Diagnose nicht erfolgt ist.

Auf die engen Beziehungen zwischen Pankreas und Leber bzw. Gallensystem weist vor allem Schorlemmer³¹⁾ hin. Die normale Blutkörperchenfenkungsreaktion dieses Falles kann gegen eine maligne Neubildung sprechen. Und auch die geringen Muskelfasern im Stuhl weisen nur darauf hin, daß die Bauchspeicheldrüse in ihrer äußeren Sekretion etwas geschädigt ist. Die Diagnose bleibt also in diesem Falle höchst unklar. Die Diastasebestimmung läßt wiederum im Stich.

Balo und Laszlo⁶²⁾ finden, daß bei Patienten, die an zu Kachexie führenden Krankheiten gestorben sind, die Fermente seitens der Organe geringer produziert werden. Sie beobachten diese Verminderung vor allem bei chronischer Tuberkulose, aber auch bei Karzinomen aller möglichen Art.

Das dürfte dann die herabgesetzten Diastasewerte dieses und des vorigen Falles erklärlich werden lassen, zumal Tinozzi⁶³⁾ ebenfalls eine Hemmung der diastatischen Wirksamkeit durch Karzinomextrakt feststellt.

Elman¹⁷⁾ hat einen Fall von Pankreaskarzinom veröffentlicht, der eine erhebliche Verminderung des Diastasewertes aufweist. Leider ist der Wert nicht zahlenmäßig angegeben.

Die Erniedrigung bei Pankreas-Ca. kann auch so gedeutet werden, daß sezernierende Drüsenteile für die Produktion des Fermentes nun ausfallen. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden — worauf schon Heiberg²⁾ hingewiesen hat — daß selbst bei weitgehendster Zerstörung des Pankreas Restdrüsenteile den Ausfall der zerstörten Drüsen durch erhöhte Arbeitsleistung weitgehend wettmachen; auch Schnitzler²²⁾ betont das in seiner Antwort werden Fett und Muskelfasern nicht im Stuhl gefunden.

18. Fall. Otto D., 66 Jahre, X/1892/34—35.

Patient spürt seit 4 Wochen Schmerzen in der Magengegend, die zur rechten Seite zieht. Beim Essen werden sie schlimmer, dazu

kommt Aufstoßen. Es besteht Widerwille gegen alle Speisen. In den letzten 4 Wochen, seit denen die Schmerzen bestehen, hat Pat. 6 kg an Gewicht verloren.

Die Leber überragt den Rippenbogen um 2 Querfinger. Im rechten Oberbauch wird Druckschmerz angegeben — dort ist auch eine Resistenz zu fühlen.

Die BKS. ist mit 78/112/128, bei der Kontrolle mit 85/128/144 erheblich beschleunigt; der Bilirubinblutspiegel beträgt 0,9 mg%, später 0,45 mg%. Die Leukocyten sind auf 11 000, später 12 000 und sogar auf 15 000 angestiegen. Öfters treten Durchfälle auf, doch werden Fett- und Muskelfasern nicht im Stuhl gefunden.

Die Diastafewerte sind:

21. 12. 34: Urin 32 E.,

3. 1. 35: Urin 64 E.,

5. 1. 35: Urin 32 E.

Da das Krankheitsbild nicht geklärt werden kann, wird Pat. in der Chirurg. Klinik operiert.

Dabei stellt sich heraus, daß die Milz etwa auf das Doppelte, die Leber etwas vergrößert und dabei derb ist, sowie einige kleine, weißgelbliche Einziehungen aufweist.

Im Lig. gastrokolicum wird eine walnußgroße, derbe Schwellung gefunden, aus der sich nach Eröffnung grünlicher Eiter und nekrotisches Gewebe entleert. Eine Verbindung dieses Abzesses mit einem der benachbarten Organe läßt sich nicht auffinden. Die Gallenblase ist prall, mit verdickter Wand, Konkrementen sind nicht zu tasten, Inhalt ist nicht auszupressen. In der Gegend des Pankreaskopfes fühlt man einen derben, nicht abgrenzbaren Tumor — die Punktion desselben ergibt nur etwas Blut. Ein Divertikel, wie von den Internisten angenommen, läßt sich daraus nicht isolieren, obwohl die Wandungen des Duodenums nach Mobilisation derselben genau abgetastet werden. Es kann also auch durch die Operation keine sichere Diagnose gestellt werden. Weder ist die Herkunft des kleinen Abzesses im Lig. gastro-colicum geklärt, noch der Prozeß in der Umgebung des Duodenums bzw. des Pankreaskopfes.

Es wird als möglich angesehen, daß es sich um ein schwer entzündlich verändertes Duodenaldivertikel handelt oder um eine

chronische Pankreatitis mit evtl. gedeckter Perforation nach hinten.

Die erhöhte Leukocytenzahl spricht wohl mehr für die Divertikelentzündung; die Gewichtsabnahme ist sicher durch den mangelnden Appetit bedingt. Der Diastasewert läßt differential-diagnostisch im Stich.

19. Fall. Jakob A., 46 Jahre, V/1351/35—36.

Wegen chronischer Bronchitis und Emphysem ist dieser Patient in stationärer Behandlung. Bei der Untersuchung wird in der Pankreasgegend im linken Oberbauch Druckschmerz geäußert, der zum Rücken hin ausstrahlt. In der Tiefe ist dort eine Resistenz zu tasten. Doch kann nicht entschieden werden, ob eine Pankreasschädigung vorliegt, da kein weiteres Zeichen für eine solche vorhanden ist. Auch die Diastasebestimmung bringt keine Klarheit, weil sie im Harn 32 E. und im Serum ebenfalls 32 E. ergibt.

Zusammenfassend läßt sich über die „Pankreasfälle“ folgendes sagen:

Bei 15 Patienten lag eine sichere Pankreaserkrankung vor, aber nur 4 mal stimmte der Diastasewert mit dem Befund überein. In den 3 Fällen mit deutlicher Erhöhung des Harn- bzw. Blutwertes handelte es sich um akute Pankreatiten bzw. um akute Pankreasnekrose — die Diastasebestimmung war in diesen Fällen geeignet, die klinisch schon gewonnene bzw. stark vermutete Diagnose zu stützen. Zu bemerken ist dabei, daß die Bestimmung jeweils in den ersten Tagen nach dem Beginn der Erkrankung vorgenommen wurde. Auch im 4. Fall — Richard F. — stimmten die Diastasewerte mit dem Befund überein; denn es lag ja keine Pankreaserkrankung vor.

Von den übrigen 11 Patienten mit sicherer Pankreaserkrankung wiesen 6 neben Zeichen äußerer Insuffizienz einen Diabetes mellitus auf — es bestand bei diesen also auch eine innere Pankreasinsuffizienz. Der Harnwert in diesen Fällen ist 1 mal deutlich erniedrigt auf 2 E. — Fall Nr. 13 — und 2 mal liegt er an der unteren Grenze der Norm — Fall Nr. 11 und Fall Nr. 15. Die übrigen 3 Werte sind normal. Auch der Blutwert ist bei diesen Patienten durchweg normal. Weder bestätigt sich die von de Tullio³³⁾, Meyers⁴⁰⁾ und Fuchs⁴¹⁾ beobachtete Erhöhung der

Blutdiastase, noch das von Ghedini⁴²⁾ festgestellte fast völlige Fehlen derselben. Den hier gefundenen normalen Blutwert hat auch v. Straffer¹⁰⁾ bei seinen Untersuchungen erhalten. Nur 2 mal bei insgesamt 16 Patienten beobachtete er eine Erniedrigung.

Der etwas niedrige Harnwert von 8 E. in den Fällen 11 und 15 und die deutliche Erniedrigung auf 2 E. im Fall 13 treffen mit den Ergebnissen von Wohlgemuth¹⁾, Marino³⁷⁾ und Bettoni⁴³⁾ zusammen.

Bei den übrigen 5 Patienten handelte es sich um leichtere und mehr chronisch verlaufende Fälle, deren normale Werte sich durchaus mit der Annahme verschiedener Autoren, die nur bei akuter Pankreatitis eine Vermehrung der Diastase finden, z. B. Roloff¹²⁾, Oesterberg¹³⁾, Wildegans¹⁶⁾, Douglas¹⁸⁾, Felsenreich²²⁾, Rostock²⁵⁾ u. a., decken.

Bei 4 Patienten konnte die Diagnose klinisch nicht sicher gestellt werden. Auch die Diastasebestimmung im Harn oder im Blut war nicht geeignet, die klinischen Untersuchungsergebnisse klarzustellen und zu stützen, da sich 3 mal normale Werte und 1 mal eine Erniedrigung ergab.

Diese 3 normalen Werte besagen aber nicht, daß eine chronische Pankreasaffektion auszuschließen ist, da eine solche nach Ansicht einiger Untersucher keine Vermehrung der Diastase im Gefolge zu haben braucht. Auch der eine erniedrigte Wert spricht aus den gleichen Gründen nicht gegen eine mögliche Pankreasaffektion. Ja — wenn man mit Baló und Laszlo⁶²⁾ gehen will, und vor allem an den Befund von Elman¹⁷⁾ denkt, kann man gerade diesen erniedrigten Wert gut für die Diagnose einer malignen Neubildung der Bauchspeicheldrüse heranziehen, sodaß auch dieser Fall dann in positivem Sinne zu bewerten wäre. Der entgültige Beweis durch Operation oder Obduktion steht aber, wie schon gesagt, aus.

Zu Kachexie führende Krankheiten.

Da die eine Patientin mit Pankreas-Karzinom eine Erniedrigung des Diastasewertes aufweist, dürfte es am Platze sein, die anderen Fälle von Karzinomen bzw. andern zu Kachexie führenden Krankheiten im Anschluß zu besprechen:

20. Fall. Johann Tr., 47 Jahre, V/1793/34—35.

Seit 1 Jahr leidet Pat. an Durchfall. Der Leib wird dabei immer dicker, die Haut verfärbt sich gelblich, und es tritt Juckreiz auf. Der Stuhl ist grauweiß, der Urin dauernd sehr dunkel, fast schwarz. Da Leibesumfang und Gelbfärbung immer mehr zunehmen, wird Pat. zur Klinik eingewiesen.

Er befindet sich in schlechtem Ernährungs- und Kräftezustand, die Haut und die Schleimhäute sind braunschwarz verfärbt. Der Leib ist durch Ascites stark aufgebläht, die Leber ragt 8 cm unter dem Rippenbogen hervor. Die Blutkörperchenfenkungsreaktion nach Westergreen ist auf $25/52/92$ beschleunigt. Als Diastafewerte finden sich am 29. 11. 34 im Serum 4 E. und im Harn ebenfalls 4 E., im Serum also etwas, im Harn deutlich erniedrigt. Bei der Kontrolle am 6. 12. 34 ergibt sich im Harn der untere Normalwert von 8 E.

Bei der Operation in der Chirurg. Klinik ergibt sich ein bohngroßes, infiltrierendes, obliterierendes Karzinom des Ductus choledochus an der Grenze zwischen Ductus hepaticus und Ductus cysticus sowie eine Lebercirrhose.

Wir finden bei diesem Patienten also eine Bestätigung der Untersuchungen von Baló und Laszlo⁶²⁾, welche ja eine Verminderung nicht nur der Diastase, sondern aller Verdauungsfermente feststellen bei Patienten, die an zu Kachexie führenden Krankheiten gestorben sind. Vielleicht kann die Feststellung v. Straffer's¹⁰⁾ ebenfalls in dieser Richtung gedeutet werden — er fand ja, daß bei Patienten mit chronischer Tuberkulose mehr Werte von 8 E. im Blut als von 16 E. auftreten.

Die Hemmung durch Stoffwechselprodukte der Karzinome, die Tinozzi⁶³⁾ feststellt, kann ebenfalls als Erklärung herangezogen werden.

Ebenfalls eine deutliche Verminderung des Harnwertes zeigt der folgende Patient.

21. Fall. Paul B., 63 Jahre, V/701/35—36.

Er hat seit 1 Monat keinen Appetit, fühlt sich elend und müde, nach dem Essen tritt Erbrechen ein, dem Erbrochenen ist oft Blut beigemischt. Er verspürt unter dem linken Rippenbogen

Spontanfchmerzen. Der Stuhl ift fchwarz. Er bemerkt deutliche Gewichtsabnahme.

Am 16. 5. 1935 wird Pat. in ftark reduzierten Kräfte- und Ernährungszuftand eingeliefert. Die Haut zeigt anaemifch-gelblichen Farbton. Im Oberbauch ift ein fauftgroßer, harter, druckfchmerzhafter Tumor zu fühlen, der gegen die Unterlage wenig, gegen die Haut gut verfchieblich ift. Aus dem fonftigen klinifchen Bild, vor allem dem Ergebnis der Röntgenaufnahmen ergibt fich die fichere Diagnose auf Magen-Karzinom, die nach Beobachtung in der Chirurg. Klinik von dort beftätigt wird.

Die Diaftafewerte find:

8. 8. 35	Harn 2 E.,
10. 10. 35	Harn 8 E.,
14. 10. 35	Serum 32 E.

Unter langfamer Verflechterung des Allgemeinbefindens tritt am 18. 1. 1936 der Exitus ein.

Der an der oberen erlaubten Grenze liegende Blutwert rührt wahrſcheinlich daher, daß die Nieren infolge des Darniederliegens faſt aller Funktionen des kachektifchen Körpers nicht mehr wie im normalen Zuſtande ſo viel Diaſtaſe in den Harn ausſcheiden. Und vielleicht iſt das auch der Grund für die Verminderung der Harndiaſtaſe. Natürlich kann man auch wieder an das Ergebnis von Baló und Laſzlo⁶²⁾, oder an das von Tinozzi⁶³⁾ denken.

Die nächſten Fälle zeigen neben normalen Blutwerten, daß der Harnwert jedesmal an der unterſten Grenze liegt.

22. Fall. Martha Schw., 43 Jahre, IX/1045/34—35.

Aus der Familien-Anamnefe geht hervor, daß ein Bruder der Pat. eine „mannskopfgroße Gefchwulſt“ im Leib gehabt hat und daran geſtorben iſt — und daß eine Schweſter an einem „Gewächs im Leib“ operiert worden iſt.

Die Pat. ſelbſt hat hintereinander 6 Fehlgeburten (mens II bis III) gehabt, angeblich, weil „die Milz drückte“. Seit dem 14. Lebensjahr hat nämlich Pat. Druck und Schmerzen im linken Oberbauch, die manchmal nach Herz und Rücken ziehen. Seit Februar

1934 ist sie leicht gelblich verfärbt. Zuletzt sind die Schmerzen schlimmer, krampfartig geworden.

Im Leib fühlt man unter dem linken Rippenbogen ziemlich weit nach hinten einen etwa kindskopfgroßen Tumor, der median fast bis zur Mittellinie und fast bis zum Nabel reicht. Er ist hart, aber nicht druckschmerzhaft, weicht bei Druck aus und ist mit der Atmung verschieblich. Die Leber überragt medial den Rippenbogen kaum, lateral reicht sie fast bis zur Darmbeinschaufel. Der Bilirubin Spiegel im Blut ist dauernd etwas erhöht auf 1,4; 1,48; 1,45 mg%. Das Blutbild zeigt eine geringe Poikilocytofe.

Die Diastase beträgt

am 4. 8. 34 im Harn 8 E.,

am 9. 8. 34 im Harn 8 E.,

ist dort also an der unteren Grenze.

Die Diagnose, die durch den therapeutischen Erfolg der Röntgenbestrahlung auch bestätigt wird, lautet auf Milztumor unklarer Genese.

Die gleichen Diastafewerte zeigt auch der folgende Fall.

23. Fall. Wilhelm K., 43 Jahre, V/2514/34—35.

Im Jahre 1918 hat Pat. Gelenkrheuma gehabt, und seitdem leidet er an Verdauungsstörungen, Druck und Völlegefühl im Oberbauch und Brechreiz; fette Speisen werden nicht vertragen.

In letzter Zeit Erbrechen etwa 4—5 Stunden nach der Nahrungsaufnahme. Der Stuhl ist tonartig weißlich, der Urin rötlich-braun verfärbt. Das Blutbild läßt eine leichte sekundäre Anaemie deutlich werden, die BKS beträgt am 6. 3. 35 60/85/113, am 19. 3. 35 noch 48/90, der Bilirubingehalt des Blutes ist 2,8 mg%, fällt auf 1,7 mg%. Die Diastasebestimmung zeigt am 16. 3. 35 im Serum 8 E., im Harn ebenfalls 8 E. Die Gallenblasendarstellung ergibt keinen Schatten, es wird aus dem ganzen klinischen Bilde auf einen Stein oder — wegen der beschleunigten BKS — auf einen Tumor der Gallenwege geschlossen.

Eine sichere Diagnose hat sich hier nicht stellen lassen, jedoch glaube ich aus der beschleunigten Senkung und gerade aus dem niedrigen Harndiastafewert, daß es sich eher um eine maligne Neubildung als um einen Stein gehandelt hat.

Weniger für die Anschauung von T i n o z z i ⁶³⁾ — Hemmung der diastatischen Wirksamkeit durch Karzinomprodukte — als für die von B a l o und L a s z l o ⁶²⁾ — Kachexie wird von diesen für den niedrigen Wert angeschuldigt — spricht der nächste Fall, der ebenfalls einen Harnwert an der unteren Grenze aufweist, wie ihn auch v. S t r a f f e r ¹⁰⁾ bei feinen Tuberkulosepatienten gefunden hat.

24. Fall. Klara Sch., 49 Jahre, V/56/34—35.

Mit 23 Jahren hat die Pat. Gallenblasenbeschwerden mit Schmerzattacken in der rechten Seite und Erbrechen gehabt. Seit Weihnachten 1933 hat sie wieder Schmerzen im Bauch, dazu äußerst heftige Kopfschmerzen und starke Gewichtsabnahme. Pat. wird in kachektischem Zustand am 23. 1. 1934 eingeliefert. Die inneren Organe sind ohne krankhaften Befund, die Zunge ist belegt, in der Gallenblasengegend wird leichter Druckschmerz geäußert. Die Röntgenaufnahme zeigt eine protische Gallenblase mit Konkrementen. Am 5. 2. 34 wird Pat. zur Chirurg. Klinik verlegt, da die Schmerzattacken immer heftiger werden und peritonitische Reizerscheinungen hinzu kommen. Eine Operation wird dort aber nicht vorgenommen, da die peritonitischen Erscheinungen zurückgehen. Am 5. 3. 34 Rückverlegung zur Medizin. Klinik. Symptome seitens der Gallenblase sind nicht mehr vorhanden. Der Diastafewert beträgt im Harn 8 E., ist also an der unteren Grenze, ist im Serum mit 16 E. normal.

Da der Haemoglobingehalt des Blutes nach Sahli 53% beträgt, und die Erythrocytenzahl auf 2,9 Millionen gesunken ist, taucht der Verdacht auf Perniciosa auf, der sich aber nicht stützen läßt. Es wird eine allgemeine Kräftigungstherapie versucht. Eine Infulin-Maßkur ist jedoch nicht möglich, da Pat. schon bei 5 E. Infulin einen hypoglykämischen Schock bekommt. Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf Simmond'sche Kachexie wird immer sicherer — Kopfschmerzen, Neigung zu Hypoglykämie, dazu ein schlechtes Konzentrationsvermögen der Nieren, bedeutende und fortschreitende Abmagerung — zumal die eingeleitete Behandlung mit Praephyson sehr guten Erfolg hat.

Im Gegensatz dazu steht nun folgender

25. Fall. Gertrud R., 78 Jahre, V/1062/34—35.

Pat. hat seit etwa 5 Wochen Schmerzen im Oberbauch, die in den Rücken ausstrahlen, mit Aufstoßen und Brechreiz. Der Urin ist rot gefärbt. Hinzu kommen Stiche an der Herzspitze, Atemnot bei Anstrengungen, Gewichtsabnahme.

Der Befund am 9. 8. 1934 ergibt bei der ziemlich kachektischen Pat. über der Lunge links oben Dämpfung und abgeschwächtes Atemgeräusch, vereinzelte Rasselgeräusche sind zu hören. Das Herz hat unregelmäßigen Rhythmus und Extrasystolen, was jedoch als Alterserscheinung gleich der bei Anstrengungen auftretenden Atemnot gedeutet wird. Am Leib ist unter dem Sternum Druckschmerz festzustellen.

Es werden Hyperazidität sowie okkultes Blut im Stuhl gefunden. Die BKS. ist dauernd beschleunigt, und zwar auf $48/84/120$, $71/105/122$. Die Leukocyten sind auf 10400 und auf 10000 gestiegen.

Da am 3. 9. 34 starke Schmerzen im Leib auftreten, wird die Diafastabestimmung gemacht, die im Harn den Höchstwert von 64 E. ergibt. Unter dauernder Verschlechterung, zunehmendem Kräfteverfall und Icterus tritt am 18. 9. 34 der Tod ein. Die Sektion bestätigt die Diagnose, die vorher schon gestellt war: sie zeigt einen Krebs der Gallenblase und der intrahepatischen Gallengänge mit Metastasen in der Umgebung, die auch in den Pankreaskopf eingewachsen sind.

Der Harnwert von 64 E. statt der in den vorigen Fällen gefundenen Werte von 8 E. kann aus dem Einwachsen der Krebsmetastasen in den Pankreaskopf und die dadurch gesetzte Schädigung der Bauchspeicheldrüse bedingt sein. Der scheinbare Widerspruch zu den vorigen Ergebnissen findet hiermit seine Erklärung. Dieser Harnwert steht jedoch in Widerspruch zu der Erniedrigung des Harndiafastewertes, die Elman¹⁷⁾ bei Pankreas-Ca. gefunden hat.

Ebenfalls einen normalen Harn-Diafastewert weist die folgende Patientin auf.

26. Fall. Thereſe M., 59 Jahre, V/1114/34—35.

Die Mutter der Pat. iſt an Leberkrebs geſtorben. Sie ſelbſt iſt mit 39 Jahren wegen einer „Unterleibsgewuchſt“ operiert worden.

Sie wird eingeliefert, weil ſie ſeit 4 Monaten kolikartige Schmerzanfälle in der rechten Seite hat, die als Gallenſteinkoliken gedeutet werden. Sie befindet ſich in einem guten Ernährungs- und Kräftezuſtand. Durch die adipöſen Bauchdecken fühlt man eine geringe Reſiſtenz unter dem rechten Rippenbogen, deſgleichen beſteht dort Muskelfpannung und Druckſchmerz. Die Röntgenaufnahme des Magendarmkanals zeigt nichts Pathologiſches, die Gallenblaſendarſtellung verläuft ergebnislos.

Wegen der Leukocytoſe von 9400, der auf 55/87/117 beſchleunigten Senkung, die ſpäter auf 67/101/125 und ſchließlich ſogar auf 91/122/132 anſteigt, ſowie wegen der medikamentöſen und diätetiſchen Unbeeinflußbarkeit des Leidens taucht der Verdacht auf Krebs der Gallenwege oder der Gallenblaſe auf. Die Operation zeigt, daß es ſich tatſächlich um ein Karzinom der Gallenwege handelt. Der Diaſtafewert iſt bei dieſer Pat. mit 32 E. im Harn völlig normal.

Ein ähnliches Bild zeigt der

27. Fall. Elife Kr., 58 Jahre, V/1143/34—35.

Seit $\frac{1}{4}$ Jahr fühlt Pat. ſich ſehr müde, ſie hat keinerlei Appetit. In der Magengegend hat ſie dauernd Druck und Völlegefühl, fette Speiſen kann ſie ſchlecht vertragen. Dazu bemerkt ſie eine auffällige Gewichtsabnahme. Im linken Epigaſtrium wird bei der Unterſuchung Druckſchmerz geäußert, es iſt hier eine deutliche Reſiſtenz zu fühlen. Die inneren Organe ſind ſonſt ohne krankhaften Befund. Die Senkung iſt auf 80/112/140 beſchleunigt, es findet ſich eine Leukocytoſe von 22600. Die Röntgenaufnahme läßt einen Tumor im Oberbauch erkennen, der mehr nach rechts gelegen iſt. Wegen der Gewichtsabnahme, dem Alter, der Beſchleunigung der Blutkörperchenſenkungsreaktion wird dieſer Tumor für eine maligne Neubildung angeſehen, die der Gallenblaſe oder dem Pankreas angehört. Wegen der ſtarken Leukocytoſe kann eine Entzündung aber nicht ganz ausgeſchloſſen werden, ſodaß in dieſem

Fall eine sichere Diagnose nicht möglich ist, zumal der normale Diaftafewert — im Serum 16 E., im Harn 32 E. — in jeder Beziehung im Stiche läßt.

Je 1 Fall von Magenkarzinom, Gallengangskarzinom, Lebermetastasen bei Portiokarzinom, malignem Nierentumor, malignem Milztumor und 1 Fall von Wirbelfäulenkaries weisen völlig normale Werte von 16 E. im Blut bzw. 16 und 32 E. im Harn auf.

Bei 14 Patienten mit Karzinomen und anderen Erkrankungen, die zu Kachexie führen bzw. führen können — das unter den Pankreasfällen besprochene Karzinom ist hier eingeschlossen — ist also 6 mal ein Absinken des Harndiaftafewertes auf die unterste normale Grenze festzustellen, 7 mal werden normale Werte gefunden, und 1 mal tritt sogar der Höchstnormalwert von 64 E. auf, der aber höchstwahrscheinlich durch eine Pankreasschädigung infolge Einwachsens von Karzinommetastasen in die Bauchspeicheldrüse bedingt ist.

Die Feststellungen von Tinozzi⁶³⁾ und Balo und Laszlo⁶²⁾ treffen also nicht für alle, sondern nur für einen Teil der Fälle zu. Vor allem sind das diejenigen Fälle, die mit ausgesprochener Kachexie einhergehen — und die oben erwähnten Autoren verlangen ja gerade eine solche Kachexie, wenn die Fermentmengen vermindert sein sollen.

Leber, Gallengänge und Gallenblase.

Auch in 28 Fällen von Erkrankungen der Leber, der Gallenblase oder der Gallengänge ist der Diaftafewert bestimmt worden.

17 mal wurden völlig normale Harn- bzw. Blutwerte gefunden. Es handelte sich dabei um Fälle von Ikterus catarrhalis, akuter und chronischer Cholelithiasis und Cholecystitis bzw. Verwachsungen danach und Hepatitis. 5 Patienten wiesen Werte an der oberen erlaubten Grenze auf. Es handelte sich dabei um Cholecystitis, die mit Achylia gastrica verbunden war, sowie 3 Fälle von Cholelithiasis und 1 Fall von Ikterus catarrhalis.

5 weitere Patienten wiesen im Harn den unteren Grenzwert von 8 E. auf und 1 Patientin den unteren Blutwert von 4 E. Da-

bei lautete die Diagnose einmal Icterus catarrhalis, 5 mal Cholethiasis bzw. Cholelithiasis cum Cholecystitis.

Der größte Teil der Diagnosen konnte durch Röntgenaufnahmen, einige Fälle auch durch Operation mit Sicherheit gestellt werden.

Magen-Darmerkrankungen.

Bei 26 Patienten, deren Beschwerden oder Befund auf den Magen oder den Darmkanal hinführen, wurde die Diätstufefestimmung vorgenommen.

Es handelte sich um Fälle von Hyperazidität, chronischer Gastritis (atrophierender und hypertrophierender), Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Ulcus pepticum jejuni und je 1 Fall von Schleimhautpolypen im Rectum mit Kolitis, von gripöser Enteritis, von chronischer Obstipation, von subchronischem Kolon-Ileus und von unklaren Verdauungsbeschwerden.

Bei 18 von diesen 26 Patienten ergaben sich normale Harn- bzw. Blutwerte. 4 mal wurde die untere Grenze der Norm erreicht, 2 mal die obere und in 2 Fällen zeigte sich eine Erhöhung. Diese beiden Fälle sollen kurz wiedergegeben werden.

28. Fall. Friedhelm H., 21 Jahre, V/2000/34—35.

Aus der Anamnese geht hervor, daß Patient schon 3 Diäten wegen Ulcus duodeni mitgemacht hat, und er ist im Juni 1934 wegen Cholecystitis und Cholangitis mit Icterus behandelt worden.

Er wird aufgenommen, weil wieder heftiger Nüchternschmerz sowie faures Aufstoßen eintreten und wegen beginnender Gelbfärbung der Skleren und der Haut. Außer einem leichten Systolikum über der Herzspitze wird am 28. 12. 34 ein normaler Organbefund erhoben. Im Leib besteht kein Druckschmerz. Die klinische Untersuchung ergibt eine Bilirubinaemie von 2,9 mg%, die am 4. 1. 35 auf 3,1 mg% angestiegen ist. Die Gastroskopie zeigt am 31. 12. 34 eine chronische hypertrophische Corpusgastritis. Die Röntgenaufnahme am 4. 1. 35 läßt einen Schrumpfbulbus und an der Hinterwand ein deutliches Ulcus erkennen. Die Bestimmung

der Harndiafese ergibt am 3. I. 35 den Wert von 128 E., der am 5. I. 35 wieder 32 E. beträgt.

Die Diagnose lautet: Ulcus duodeni und chronische Gastritis. Hinzu kommt noch eine leichte Cholangitis, die außer einer leichten Gelbfärbung der Skleren nur durch die Bilirubinaemie in Erscheinung tritt und die dem Patienten keinerlei Beschwerden verursacht. Die Temperatur und die BKS. sind völlig normal.

Vielleicht ist diese leichte Cholangitis aber die Ursache für den etwas erhöhten Diafesewert am 3. I. 35. Wahrscheinlich ist es durch die Cholangitis zu einer geringen Abflußhinderung an der Papilla Vateri gekommen — evtl. sogar nur auf nervösen Reiz hin — was dann zu einer vorübergehenden Stauung der Diafese und somit Erhöhung im Blut und weiterhin natürlich im Harn geführt hat. Dieser Diafesewert von 128 E. bei einer Bilirubinaemie von 3,1 mg% läßt es unwahrscheinlich sein, daß eine Bilirubinaemie stärkeren Grades auf die Diafese hemmend wirkt.

Der 2. Fall ist wesentlich schwieriger zu beurteilen:

29. Fall. Magdalena Schw., 40 Jahre, V/I/35—36.

Pat. hat der Anamnese nach viel mit Anginen zu tun gehabt. 1932 hatte sie eine eitrige Angina mit nachfolgender Nephritis. 1923 wird sie wegen Antelexio uteri operiert, gleichzeitig wird der Wurmfortsatz entfernt. Seit 1936 hat Pat. mit dem Magen zu tun, 1928 wird sie operiert wegen Magenptose und bestehender Verwachsungen am Magenausgang.

Sie kommt jetzt zur Aufnahme, weil sie in der letzten Zeit sehr häufig erbricht — angeblich sollen dabei auch Speisen erbrochen werden, die sie schon vor längerer Zeit genossen hat. Obstipation wechselt mit Diarrhoen ab. Öfters soll der Stuhl dunkel, fast schwarz gewesen sein. Im Leib wird leichter Druckschmerz in der Mitte des Oberbauchs festgestellt. Die Hände zeigen feinschlägigen Tremor.

Am 5. 9. 34 läßt die Röntgenaufnahme und Durchleuchtung eine Gastropotose mit Sturzentleerung erkennen, sowie eine Gastro-Enterostomie hinten unten. Die eine Woche später vorgenommene Gastropotomie zeigt im Corpusgebiet eine umschriebene erosive Ent-

zündung. Weder die Röntgenaufnahme noch die Gastroskopie geben einen Anhaltspunkt für ein Geschwür.

Die Diagnose wird auf Gastropse und leichte chronische Gastritis gestellt.

Seltenerweise ergibt sich bei der Diastasebestimmung am 7. 9. 1934 im Harn ein Wert von 256 E., der am 11. 9. 1934 sogar auf 512 E. gestiegen ist. Der Blutwert ist am 8. 9. 1934 normal. Eine einleuchtende Erklärung für diese Erhöhung des Harnwertes kann kaum gegeben werden. Denn es sind keine sonstigen klinischen Zeichen da, die für eine Pankreatitis sprechen. Die meisten Autoren erwähnen ja allerdings, daß eine selbst starke Erhöhung des Diastasewertes keineswegs mit größeren anatomischen Änderungen am Pankreas einherzugehen braucht — sodaß diese Vermehrung der Diastase ihnen das einzige Zeichen für eine Pankreatitis ist.

Der leichte Druckschmerz im Oberbauch ist zu vieldeutig, als daß er herangezogen werden könnte; er ist viel eher auf die Gastritis als auf eine Pankreatitis zurückzuführen. Die Diarrhoen allerdings könnten zwar für eine Pankreatitis sprechen — doch steht dem der Wechsel mit Obstipation sowie die dunkle Farbe der Stühle entgegen. Sie sind wahrscheinlich durch die Sturzentleerung des Magens bedingt, die bei der Durchleuchtung festgestellt wurde. Bei dem immerhin hohen Diastasewert und den vorhandenen Verdauungsstörungen läßt sich eine chronische Pankreatitis jedoch nicht mit Sicherheit ausschließen. Auffällig bleibt jedenfalls die erhebliche Diskrepanz zwischen dem hohen Diastasewert und dem geringen klinischen Befund — man kann sogar gut sagen: dem negativen Pankreasbefund.

Sonstige Erkrankungen.

Bei 23 Patienten mit Erkrankungen der verschiedensten Art ist ebenfalls die Diastase in den genannten Medien oder in einem davon bestimmt worden.

13 mal fanden sich normale Werte, 2 mal lagen die Werte im Harn an der unteren Grenze, und zwar bei gastrischen Krisen

einer alten Lues und bei Beschwerden nach einer Prostataktomie. An der oberen Grenze lagen 3 Blut- und 2 Harnwerte. Bei den Blutwerten handelte es sich in einem Fall um sekundäre Anaemie nach wiederholtem schweren Nasenbluten — dieser Fall steht also im Gegensatz zu der von Marino³⁷⁾ bei primären und sekundären Anaemien gefundenen Erniedrigung des Harnwertes — und im andern Falle um eine doppelseitige Cystenniere mit beginnender Uraemie. Leider mußte diese Patientin auf Wunsch der Angehörigen entlassen werden, sodaß eine weitere Bestimmung nicht gemacht werden konnte.

30. Fall. Elisabeth M., 51 Jahre, IV/310/35—36.

Diese Pat. hat nicht nur im Serum den Höchstnormalwert von 32 E., sondern zeigt auch gleichzeitig im Harn den Höchstwert von 64 E. Es handelt sich um latente Lues, sowie um Arrhythmia perpetua und Vorhofflimmern. Während einer Neo-Salvarfankur tritt plötzlich ein schwerer Ikterus auf, der wahrscheinlich auf eine Leberschädigung infolge von akuter Neosalvarfankurvergiftung zurückzuführen ist — der leichte Anstieg der Harn- und Blutdiastase fällt in die Zeit dieser Schädigung. Eine solche Leberschädigung spielt ja nach v. Falkenhäufen⁶⁴⁾ und vor allem nach Reid⁵⁾ eine ziemlich große Rolle für die Diastase eben im Sinne der Fähigkeit, Diastase produzieren und solche dem Blute zuführen zu können. Der

31. Fall. Wilhelm B., 24 Jahre, IV/334/33—34,

zeigt zweimal den Höchstwert von 64 E. im Harn. Patient leidet seit 1929 an Herzbefwerden, hat in der letzten Zeit vor der Aufnahme Fieber, Husten, etwas Auswurf. Da er Schmerzen in der Magengegend angibt, die unabhängig vom Essen auftreten und ständig da sind, wird die Diastasebestimmung im Harn gemacht, die oben genannte Werte ergibt. Head'sche Zone, Druckempfindlichkeit, Stuhlveränderungen oder sonst ein Zeichen für eine Pankreasaffektion finden sich nicht.

Patient hat dauernd hektisches Fieber mit Remissionen. Die Herzfunktionsprüfung zeigt eine Rückkehr zur Norm erst nach 5 Minuten. Über der Mitralis ist ein reibendes und klappendes Ge-

räusch zu hören. Die Röntgenaufnahme und die Durchleuchtung lassen einen Prozeß im linken Unterlappen und Zwerchfell mit Erguß und Adhäsionen erkennen.

Die Diagnose wird auf Endokarditis und eine von dieser ausgehenden Sepsis sowie auf einen tuberkulösen Lungenprozeß gestellt.

Der gefundene Höchstwert vom 64 E. steht also im Gegensatz zum Ergebnis v. Straffer's¹⁰⁾, der ja bei tuberkulösen Erkrankungen mehr niedrige als höhere Werte findet. Allerdings ist zu bedenken, daß v. Straffer nur den Blutwert berücksichtigt und sich nicht über den Harnwert ausläßt.

Durch die Sepsis ist wahrscheinlich der Wert von 64 E. zu erklären, was mit Thom sen²⁶⁾ übereinstimmt und sich auch den Werten von Germer⁵⁸⁾, Garry⁵⁹⁾ und Grumke⁶⁰⁾ nähert.

Der 32. Fall, Heinrich K., 67 Jahre, IX/1307/35—36, leidet an perniziöser Anämie. Im Serum ist der Diafawert mit 8 E. normal, im Harn weist er jedoch den Höchstwert von 64 E. auf. Auch dieser Fall bildet also einen Gegensatz zu Marino³⁷⁾, der bei Anämien eine Verminderung der Diafase im Harn feststellt und der sogar bei Perniziösa einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Erniedrigung und der Zahl der Vitalgranulierten behauptet.

33. Fall, Karl P., 62 Jahre, VII/937/34—35.

Im Leib ist rechts neben dem Nabel unter dem Rippenbogen ein etwa apfelgroßer, nicht druckschmerzhafter, gut verschieblicher und gegen die Umgebung gut abgrenzbarer Tumor zu tasten, der eindeutig der Niere angehört. Im Harnsediment finden sich Zylinder, im Harn ist das Eiweiß positiv, das spezifische Gewicht des Harns bleibt dauernd bei 1010, sodaß die Diagnose Schrumpfniere gestellt werden kann. Der Reststickstoff im Blut ist mit 112,7 mg%, der Blutdruck nach RR. ist mit 145/170 und bei der Kontrolle 165/80 dem Alter entsprechend nur ganz gering erhöht. Der Blutdiafawert ist mit 16 E. völlig normal, dagegen zeigt der Harnwert eine Erniedrigung auf 4 E.

Dieser Fall bestätigt also das Ergebnis von Wohlgemuth¹⁾, Schmerel³⁶⁾, Mellinghoff³⁹⁾ sowie von Marino³⁷⁾ und Noguchi³⁸⁾. Auch Schaanning⁶⁾ kann herangezogen werden.

2 Patienten weisen bei normalen Blutwerten im Harn eine leichte Erhöhung auf.

34. Fall, Gertrud B., 23 Jahre, IV/1778/34—35.

Seit 5 Monaten hat Pat. Beschwerden in der Herzgegend und Beklemmung beim Atmen, bei Anstrengungen Kurzatmigkeit und Herzklopfen. Über allen Ostien ist ein systolisches Geräusch zu hören, am lautesten über der Aortenklappe. Die Rachen Schleimhaut ist gerötet, aus den Tonsillen lassen sich dicke Pfröpfe ausdrücken, und aus der Anamnese geht hervor, daß Pat. öfters mit Anginen zu tun gehabt hat. Die Diagnose lautet auf chronische Tonsillitis mit Endokarditis auf Grund der von den Tonsillen ausgehenden Sepsis.

Mit Thom sen²⁶⁾, der ja Wert auf einen septischen Zustand legt, sowie mit Germer⁵⁸⁾ und Grumke⁶⁰⁾ kann die Diastaseerhöhung dieses Falles auf 128 E. erklärt werden. Germer und Grumke schuldigen den Infekt für die Erhöhung an, während Thomson allerdings an eine leichte begleitende Pankreatitis glaubt.

35. Fall. August L., 54 Jahre, X/405/35—36.

Hier handelt es sich nach dem Ergebnis der klinischen Untersuchungen um vorzeitige Alterserscheinungen, die aber die Diastasevermehrung auf 128 E. im Harn bei einem Blutwert von 16 E. nicht genügend erklären. Man könnte evtl. an eine geringe arteriosklerotische Veränderung denken.

Die übrigen Fälle, die vollkommen normale Werte gezeigt hatten, verteilen sich auf Lungenemphysem mit Arteriosklerose, allgemeine Arteriosklerose, septischen Zustand bei Empyem der Kieferhöhle, septischen Zustand bei Lues (Gegensatz zum 31. und 34. Fall sowie zu der Anschauung von Thomson, Grumke, Germer!), tabische Krisen, Angina pectoris, sekundäre Anämie nach Magen-Darmblutungen unklarer Genese, Haemorrhagische Diathese bei Avitaminose, atypische klimakterische Beschwerden, vegetative Labilität und schließlich Paratyphus BI. Dieser

36. Fall, Luzia E., 23 Jahre, I/868/35—36,

steht den Ergebnissen von Grumke⁶⁰⁾ entgegen, der ja bei Typhus und Paratyphus immer erhöhte Werte findet und sogar an

einen Zusammenhang zwischen Höhe der Diaftasevermehrung und Schwere der Krankheit denkt, während hier ein Harnwert von 32 E. vorliegt.

Zusammenfassendes über die Ergebnisse der Medizinischen Klinik.

Die Ergebnisse der Medizinischen Klinik zeigen, daß der Harn-diaftasewert von 64 E., der bisher von den meisten Autoren als obere erlaubte Grenze angesehen wurde, zu niedrig ist. Denn derselbe wird des öfteren bei andern Erkrankungen gefunden, und zwar auch bei solchen, die gar nichts mit der Bauchspeicheldrüse zu tun haben. Die normale Streuungsbreite des Harndiaftasewertes muß mindestens bis 128 E. gerechnet werden. Ein Wert bis 128 E. besagt demnach gar nichts. Man kann ihn nicht für differentialdiagnostische Erwägungen heranziehen. Ein Diaftasewert im Harn von etwa 1024 E. und darüber ist ein deutliches Zeichen für eine akute Pankreatitis oder akute Pankreasnekrose. Voraussetzung ist dabei, daß die Bestimmung in den allerersten Tagen nach Krankheitsbeginn vorgenommen wird, da es sich immer wieder im Verlauf der Erkrankung zeigt, daß der Diaftasewert schnell wieder zu normalen Werten absinkt bei Weiterbestehen der Erkrankung!

Auf Grund dieser Beobachtung haben einige Untersucher die Forderung aufgestellt, die Bestimmung in den ersten Tagen oder sogar Stunden vorzunehmen, u. a. Felsenreich²¹⁾, Skoog²⁾, Heiberg²⁾.

Schwierigkeiten machen Werte von 256 E. und 512 E. Diese allein weisen noch nicht auf eine Erkrankung des Pankreas hin — es muß vielmehr gefordert werden, daß für die Diagnose das gesamte klinische Bild berücksichtigt wird. Sind in demselben Zeichen für eine Pankreaserkrankung vorhanden, so stützt ein Harndiaftasewert von 256 E. oder von 512 E. die Diagnose Pankreatitis. Gibt das klinische Bild keine Klarheit über einen Prozeß, sind z. B. neben Pankreaszeichen noch Symptome einer andern Erkrankung zu finden, so gibt ein Diaftasewert von 256 E. oder 512 E. den Entscheid. Denn dann handelt es sich um eine Pankreasaffektion, zum min-

desten um eine gleichzeitig neben der andern Krankheit bestehende Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, um eine Mitbeteiligung.

Die bisherige untere Grenze von 8 E. dürfte zu Recht bestehen. Dieser untere Grenzwert wird öfters beobachtet bei Patienten mit tuberkulösen Krankheiten und anderen Erkrankungen, die zu Kachexie führen, z. B. Karzinom, Simmond'sche Kachexie u. a.

Bei den entsprechenden Fällen der Medizinischen Klinik zeigt es sich, daß immer dann, wenn Kachexie bestand, der Patient mit feinen Kräften stark heruntergekommen war, die untere Norm erreicht wurde oder gar eine Erniedrigung auftrat. Doch lassen diese niedrigen oder erniedrigten Werte keine diagnostischen oder gar prognostischen Schlüsse zu. Sie sind lediglich als vielleicht interessanter Nebebefund zu werten.

Ein normaler Diastafewert — „normal“ also von 8 E. bis 128 E.! — schließt keineswegs eine chronische Affektion des Pankreas aus. Wenn klinische Zeichen einer solchen bestehen — unbestimmte Beschwerden in der Oberbauchgegend, evtl. mit zunehmender Abmagerung; diarrhoische, meist stark stinkende Stühle; Steatorrhoe; Kreatorrhoe; evtl. Diabetes — dann kann getrost die Diagnose auf chronische Pankreatitis gestellt werden, und zwar auch dann, wenn die Diastafewerte in Blut und Harn völlig normal sind.

Auch bei Verdacht auf einen Pankreastumor, vor allem eine maligne Neubildung, kann die Diastafebestimmung nichts ausfagen. Bei begründetem klinischen Verdacht auf eine Neubildung — neben den oben erwähnten Symptomen einer chronischen Pankreatitis noch ikterische Erscheinungen, evtl. palpabler Tumor — soll man sich durch einen normalen Diastafewert nicht von einer evtl. Operation zurückhalten lassen.

Irgendeine Abhängigkeit des Diastafewertes von der Temperatur, dem roten oder weißen Blutbild, der NaCl.-Konzentration, dem Rest-Stickstoff, dem Zuckergehalt, dem Bilirubinblutspiegel usw. konnte ich bei eingehendem Vergleichen der Fiebertafeln nicht finden.

III. Die Untersuchungen in der Chirurgischen Universitäts- klinik Bonn.

Die mir vorliegenden Ergebnisse stammen aus der Zeit vom 1. 1. 1934 bis jetzt.

Es sind etwa 265 Bestimmungen gemacht worden. Ich konnte nicht in alle Krankenblätter Einsicht nehmen, jedoch läßt das Ergebnis von etwa 235 Bestimmungen einige Schlüsse zu. Zum allergrößten Teil sind die Bestimmungen im Harn gemacht worden, und nur in verschwindend wenigen Fällen ist der Diastafewert im Blut festgestellt worden.

Auch hier wird die Original-Wohlgemuth-Methode angewandt — also ohne Verwendung von Pufferlösungen — da es sich herausgestellt hat, daß bei eine Zeit lang durchgeführten Vergleichsbestimmungen bei der Original-Methode dieselben Werte herauskommen, wie bei der Verwendung von gepufferten Lösungen.

Die angegebenen Werte sind in dieser Arbeit auf Grund der anfangs abgedruckten Tabelle auf Wohlgemutheinheiten umgerechnet worden, um ein einheitliches Bild zu gewinnen. Demnach wäre die normale Breite, in der sich für die Chirurg. Klinik der Harn-diastafewert bewegt, 8 E. bis 128 E. Hier liegt also die „obere Grenze“ schon von vornherein höher als bei den Untersuchungen in der Mediz. Klinik.

Magen-Darmkanal.

a) Ulkus ventriculi.

Von 16 sicheren Fällen, bei denen die Diagnose durch Röntgenaufnahmen bzw. durch die meist vorgenommene Operation durchaus sicher stand, und bei 2 Fällen, in denen die Diagnose nicht mit aller Sicherheit gestellt werden konnte, ergeben sich 15mal normale Werte. Einmal lag der Wert an der oberen Grenze von 128 E. — 2mal fand sich eine leichte Erhöhung auf 256 E. und auf 512 E. Bei dem Fall, in dem 2mal 256 E. erreicht wurden, waren die Werte einige Tage zuvor und einige Tage nachher mit 64 E. bzw. 32 E. normal. Zur Zeit der Erhöhung treten starke Durchfälle auf —

leider ist nichts gesagt über die Beschaffenheit der Stühle — doch könnten sie auf eine leichte Pankreatitis hinweisend sein.

b) Gastritis.

9 Fälle von Gastritis bzw. Gastroenteritis und Kolitis weisen alle Werte von 16 E. bis 64 E. auf, es wird also weder der untere noch der obere Grenzwert erreicht.

c) Ulkus duodeni.

Von 20 Patienten weisen 19 normale Werte auf, nur einer zeigt eine Verminderung auf 2 E., ohne daß aus der Vorgeschichte oder dem Befund oder dem Verlauf der Erkrankung für die Erniedrigung ein Anhalt sich ergäbe.

d) Ulcus pepticum jejunum.

3 Fälle zeigen die Werte von 8 E., 32 E. und 64 E. Sie halten sich also in normalen Grenzen.

e) Sonstige Magenbeschwerden.

3 Patienten mit durch Röntgenaufnahme sichergestellter Magenlenkung und 6 Patienten, bei denen die Diagnose nur auf „nervöse Magenbeschwerden“ gestellt werden konnte, weil für die angegebenen Beschwerden sich kein organischer Befund ergab, zeigen ebenfalls normale Werte.

Ein einziger Fall von Magenlenkung weist den Wert von 256 E. auf. Es wird die Frage aufgeworfen, ob wegen dieses leicht erhöhten Wertes im Verein mit den angegebenen unbestimmten Schmerzen im Leib, vor allem in der rechten Seite, eine Cholelithiasis oder eine leichte Pankreatitis vorliegt. Aber die Gallenverhältnisse sind völlig in Ordnung, desgleichen zeigt der Stuhl normale Verhältnisse, so daß die Frage nicht entschieden werden kann.

Karzinome.

a) Ca. ventriculi.

Von 30 Untersuchungen weisen 23 Patienten normale Werte auf. Nur 1mal liegt der Wert an der unteren Grenze von 8 E., während 4mal die obere Grenze von 128 E. erreicht wird und 2mal sich sogar eine Erhöhung auf 512 E. und auf 2048 E. findet.

Auch bei diesen beiden Werten, vor allem der ausgesprochenen Vermehrung auf 2048 E. findet sich weder bei der klinischen

Untersuchung noch bei der Operation ein Hinweis, daß die Bauchspeicheldrüse erkrankt ist.

b) Sonstige Karzinome.

Bei 31 Krebskranken einschließlich Karzinomen der Gallenblase und der Gallenwege wurde der Diastafewert bestimmt.

Die Beobachtungen von Elman¹⁷⁾ und Popper²⁴⁾, die bei Karzinomen meist niedrigere Werte gefunden haben — und das Ergebnis der Medizinischen Klinik, wo auch in vielen Fällen niedrigere Werte auftraten — werden hier nicht bestätigt. Denn nur 2 Werte liegen an der unteren Grenze, und 1 Fall zeigt eine Erniedrigung auf 4 E. Dieser Fall ist ein Rectum-Karzinom in fortgeschrittenem Zustand mit ziemlicher Kachexie. Bei den beiden andern Fällen handelt es sich um ein Ca. des Ductus hepaticus sowie um ein vom Corpus uteri ausgehendes infiltrierendes Karzinom, das Ileuserfcheinungen gemacht hatte, wegen der Patientin eingewiesen wurde.

Diesen 3 niedrigen Werten stehen 7 Werte an der oberen Grenze gegenüber, sowie 4 Fälle mit einer ausgesprochenen Erhöhung. Die restlichen 18 Werte sind normal. Die Fälle an der oberen Grenze verteilen sich auf folgende Erkrankungen:

3mal Ca. der Gallenblase, je 1 Fall von Carzinom des Rektum, des Oesophagus, der Papilla vateri und der linken Hand.

Bei den 4 Fällen mit Erhöhung handelt es sich um 3 Rektum-Karzinome mit den Werten 256 E., 256 E. und 512 E., und 1mal um einen Gallenblasenkrebs mit der leichten Erhöhung auf 256 E.

Es ist fetsam, daß bei der gleichen Diagnose Rektum-Ca. sich hier eine Vermehrung findet, während sich oben eine Erniedrigung gefunden hat, bei der jedoch zu bedenken ist, daß der Patient sich in kachektischem Zustand befunden hat.

Die normalen Fälle verteilen sich auf 5 Karzinome der Gallenblase, 4 Karzinome des Rektum, 2 Mamma-Karzinome und je 1 Fall von Ileocoecal-, Sigmoid-, Portio-, Oesophagus- und Unterlippen-Ca., sowie auf 2 Fälle von Ca. der Bauchspeicheldrüse, die in einem Fall nicht restlos gesichert werden konnte, während im nächsten die Operation die Diagnose auf Pankreaskopf-Ca. bestätigte.

Von insgesamt 61 Patienten, die an Karzinomen der verschied-

densten Art leiden, weisen 41 normale Werte auf. Nur 3 Patienten zeigen den unteren Grenzwert von 8 E., und nur ein einziges Mal wird eine Erniedrigung beobachtet. Dagegen zeigen 11 Patienten den Wert von 128 E., und bei 6 Kranken ist der Diaftafewert auf 256 E. und sogar bis auf 2048 E. erhöht.

Daß bei den Karzinom-Fällen der Chirurgischen Klinik nicht wie bei denen der Medizinischen Klinik eine Erniedrigung der Diaftase gefunden wurde, hat wohl seinen Grund darin, daß diese Patienten der Chirurgischen Klinik nicht in einem solch kachektischen Zustand waren, der eine Verminderung der Harndiaftase bedingt hätte — und es hat sich ja auch in der Medizinischen Klinik gezeigt, daß nur bei kachektischen Patienten die Diaftase erniedrigt ist, während Kranke in noch gutem Kräfte- und Ernährungszustand normale Werte zeigen.

Die Erhöhung der Harndiaftase bei den andern Patienten findet damit aber noch keine Erklärung. Man könnte evtl. an Metastasen im Pankreas denken, aber dann müßte die Erkrankung schon so weit fortgeschritten sein, daß die Patienten mit ihren Kräften doch schon etwas herabgekommen sein müßten. Auch hat sich kein einziges Mal bei den Operationen eine Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse herausgestellt und noch viel weniger sind Krebsmetastasen gefunden worden. Dabei muß aber betont werden, daß, wie viele Beobachter gefunden haben, eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse nicht mit sicht- oder fühlbaren Änderungen einherzugehen braucht. Es besteht also die Möglichkeit, daß bei der Operation durch Inspektion und Palpation ein „normales Pankreas“ festgestellt wird — das aber in Wirklichkeit entzündlich erkrankt ist, sei es auch nur in einzelnen Teilen. Gar leicht kann dann bei solch „normalem“ oder „gefunden“ Pankreas eine Diaftasevermehrung gefunden werden.

Der erhöhte Diaftafewert bei dem Patienten mit Gallenblasenkrebs läßt sich noch durch die Annahme einer sekundären Rückwirkung auf die Bauchspeicheldrüse erklären — indem der Ausführungsgang komprimiert oder ein Druck auf die Drüse selbst ausgeübt wird — nicht aber der erhöhte Wert der 3 Rektumkarzinome. Daselbe gilt für die Fälle, deren Werte an der oberen

Grenze liegen. Bei einem Krebs der Papilla Vateri ergibt sich leicht ein Verfluß des Pankreasausführungsganges mit Stauung und Übertritt der Diaftase in Blut und Harn. Aber warum bei einem Karzinom des Oesophagus oder gar einem solchen der linken Hand die Harndiaftase erhöht sein soll, ist schlecht zu erklären.

Gallenblase und Gallengänge.

Von 43 Bestimmungen bei Erkrankungen von Gallenblase oder Gallengänge zeigen 31 völlig normale Werte, nur 2 liegen an der unteren Grenze, 5 Fälle an der oberen Norm und 5 Fälle sind erhöht. Die Erhöhung beträgt 1mal 256 E., 2mal 512 E., 1mal 1024 E. und steigt in einem Fall sogar bis auf 8000 E. an. Bei keinem einzigen dieser Patienten mit Vermehrung der Diaftase findet sich ein Anzeichen für eine Affektion der Bauchspeicheldrüse — und auch bei der Operation werden kein einziges Mal größere anatomische Veränderungen festgestellt. Weder bei diesen erhöhten Fällen noch bei den Patienten mit den Werten an der oberen Norm, die nicht operiert sind, finden sich Druckschmerz oder Diarrhoe, so daß die Diaftasevermehrung der einzige Hinweis auf eine Mitbeteiligung der Bauchspeicheldrüse ist, wenn man eine solche annehmen will. Denn nicht immer braucht ja eine leichte Pankreasschädigung sich im makroskopischen Bild, wie es sich bei der Operation ergibt, zu zeigen.

Nierenerkrankungen.

In 10 Fällen von Nierenschädigungen der verschiedensten Art — Pyonephrose, Nierenbeckenstein, Nephritis — finden sich 9mal normale Werte, abweichend von den Ergebnissen von Wohlgemuth¹⁾, Noguchi³⁸⁾, Marino³⁷⁾ und Schmerel³⁶⁾.

Ein einziges Mal findet sich ein niedriger Wert von 4 E., der aber leicht zu deuten ist, da es sich hier um eine Nierenruptur gehandelt hat, also eine recht erhebliche Schädigung der Niere darstellt.

Sonstige Erkrankungen.

a) Appendicitis.

4 sichere und 1 fraglicher Fall liegen vor, sowie ein appendicischer Tumor. Die Harndiaftasewerte sind alle im Bereiche des Nor-

malen, liegen also zwischen 8 und 128 E. Kein einziger Wert erreicht die untere Grenze, ebenfalls keiner die obere. Die Beobachtung von Thomfen²⁶⁾, der bei Appendicitis eine Diastaseerhöhung findet, wird also in den Fällen der Chirurgischen Klinik nicht bestätigt.

b) Hernien.

Des Interesses halber wurde auch bei einigen Hernien der Diastasewert im Harn bestimmt, und von 7 Untersuchungen zeigten 6 Patienten normale Werte von 16 E. und 32 E., 1 Fall war auf 4 E. erniedrigt.

c) Struma.

3 Patienten mit Struma colloidales und 1 Patient mit wahrscheinlich maligner Struma zeigen normale Werte von 16 E. und 32 E.

d) Schädigungen des Skeletts.

Auch bei einigen Frakturen bzw. Luxationen sowie Knochenkrankungen ist der Diastasewert bestimmt worden. 6mal ergeben sich normale Werte, 1mal findet sich eine Erniedrigung auf 4 E. bei einer Olekranonfraktur.

e) Operationsfolgen.

Bei 10 Patienten mit unbestimmten Bauchbeschwerden ergab die Diastasebestimmung Werte von E. bis 64 E., 2mal wurde die Höchnorm von 128 E erreicht.

Auf Grund der klinischen Untersuchungen und der Röntgenaufnahmen konnte in allen Fällen festgestellt werden, daß es sich um Adhäsionen oder sonstige Beschwerden nach vorausgegangenen Laparatomien handelte.

f) Verschiedenes.

Die Diastasebestimmung bei 22 Patienten mit Klagen und Erkrankungen der verschiedensten Art ergab mit wenigen Ausnahmen normale Werte. Diese Ausnahmen sollen kurz angeführt werden.

37. Fall.

Der Patient wird unter dem Verdacht und mit den Symptomen der akuten Pankreasnekrose eingeliefert. Die Diastase ist auf 8192 E. erhöht. Die Operation bestätigt nicht nur die Diagnose, sondern zeigt außerdem Steine in der Gallenblase und Galle im Pankreasausführungsgang, so daß die Ursache der Pankreasnekrose

in diesem Falle geklärt ist. Die Beobachtung von Schorlemmer³¹⁾ u. a., daß bei den meisten Pankreaserkrankungen primär Schädigungen der Gallenblase oder der Gallengänge vorliegen, wird also durch diesen Fall bestätigt.

38. Fall.

Diese 50jährige Patientin hat seit 10 Jahren häufig starke Magen- und Rückenschmerzen, außerdem Aufstoßen und Sodbrennen.

Im Mai 1935 bekam sie plötzlich äußerst starke Schmerzen im Oberbauch, der Leib wurde schnell sehr dick, Pat. fühlte sich äußerst matt und elend. Dazu kamen noch Erbrechen, Stuhl- und Windverhaltung. Bei der Einlieferung am nächsten Tage ist der Leib stark aufgetrieben, es besteht eine diffuse Bauchdeckenspannung, diffuser Druckschmerz; die BKS. ist etwas beschleunigt mit $17\frac{1}{38}$, die Temperatur beträgt $39,4^0$, es besteht eine Leukocytose von 21 600. Die Diastasebestimmung ergibt den Wert von 8000 E. Unter der Diagnose auf akute Pankreasnekrose wird Pat. operiert, wobei die Diagnose bestätigt wird. Auch hier werden kleine Steine im Duktus choledochus gefunden, die wahrscheinlich zu einer Rückstauung von Galle in die Bauchspeicheldrüse geführt haben — abermals eine Bestätigung der Beobachtung Schorlemmer's³¹⁾.

39. Fall.

Dieser Pat. wird nach einem Unfall, bei dem er einen heftigen Stoß links gegen die Seite und den linken Oberbauch bekommen hat, eingeliefert. Es bestehen heftige spontane und Druckschmerzen, er macht den Eindruck eines Schwerkranken, so daß an eine Pankreasverletzung- oder Quetschung gedacht wird.

Der Diastasewert ist aber mit 32 E. normal. Leider kann keine sichere Diagnose gestellt werden, da Patient die Klinik vorzeitig wieder verläßt.

40. Fall.

Es handelt sich um einen Studenten, der mit heftigen Schmerzen in der linken Seite eingeliefert wird. An der Niere liegen völlig normale Verhältnisse vor, so daß der zuerst aufgetauchte Verdacht auf Nierenstein nicht bestätigt wird. Obwohl der Diastasewert 2048

E. beträgt, weist nichts sonst auf die Bauchspeicheldrüse hin, es wird deshalb von einer Laparatomie abgesehen. Später werden die Beschwerden in den rechten Unterbauch verlegt und auf Drängen des empfindlichen und etwas wehleidigen Patienten wird die Appendektomie ausgeführt. Der Wurmfortsatz ist jedoch ebenfalls völlig o. B.; für die geschilderten Beschwerden kann also kein pathologischer Organbefund erhoben werden.

Trotz der deutlichen Diaстаfevermehrung konnte die Diaстаfebestimmung keine Klärung bringen, sie ließ völlig im Stich.

41. Fall.

Der Patient kommt mit unklaren Beschwerden im linken Oberbauch zur Aufnahme. Es besteht dumpfes Schmerzgefühl, sowie Druckschmerzhaftigkeit der Pankreasgegend. Die Diaстаfe ist jedoch im Blut mit 8 E. und im Harn mit 128 E. normal. Irgendein weiteres Zeichen für eine Pankreasaffektion besteht außer den Schmerzen nicht, und diese sind zu vieldeutig, als daß eine Diagnose gestellt werden kann. Das Krankheitsbild kann nicht geklärt werden, da Patient bei Besserung die Klinik wieder verläßt.

Im 37. Fall entspricht die Diaстаfevermehrung dem Krankheitsbilde — im 40. Fall jedoch läßt die Bestimmung völlig im Stich insofern, als einer Diaстаfevermehrung keinerlei Organbefund, weder an der Bauchspeicheldrüse noch seitens eines andern Organs entspricht.

Ein Patient mit fieberhafter Allgemeininfektion weist den Normalwert von 64 E. auf, steht also den Ergebnissen von Germe n⁵⁸⁾ und Grumke⁶⁰⁾ entgegen, die bei Infektionskrankheiten eine Diaстаfevermehrung finden. Auch 2 Blutkrankheiten zeigen normale Werte: eine aleukämische Lymphomatose mit 32 E. und eine Thrombopenie mit 16 E. und nicht eine Verminderung, wie sie Marino³⁷⁾ festgestellt hat.

2 Patienten mit tuberkulösen Erkrankungen weisen ebenfalls normale Werte auf, anstatt der geringen Verminderung auf die untere Grenze, die von einigen Autoren gefunden worden ist, z. B. von v. Straffer¹⁰⁾. Es handelt sich um Mesenterialdrüsentuberkulose mit 16 E. und um Peritonealtuberkulose mit 32 E.

Die übrigen Fälle mit normalen Werten verteilen sich auf 2 Patienten mit Rheumabefschwerden im Rücken, 2 Patienten mit Prostatahypertrophie und je 1 Fall von Hydrocele, Pneumokokkenabzess, Lipom, Parametritis, Stauungsleber, Alkoholabusus, hämorrhagischer Aszites, Askaridenerkrankung und Beschwerden durch verschluckte Nadel.

Zusammenfassendes über die Ergebnisse der Chirurgischen Klinik Bonn.

Zusammenfassend läßt sich über die Bestimmungen, die in der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn vorgenommen worden sind, sagen, daß sie im wesentlichen daselbe Ergebnis zeigen, das schon v. Straffer¹⁰⁾ gefunden hat: nämlich in den allermeisten Fällen normale Werte.

Das vorliegende Material der Chirurgischen Klinik dürfte in manchen Fällen sogar noch größer sein als das v. Straffer's — ich erwähne nur die 20 Fälle von Ulcus duodeni gegenüber 8 Fällen des genannten Verfassers und 30 Fälle von Magenkrebs, denen auch nur wenige v. Straffer's entgegentreten.

Aber wie bei diesem finden sich meist normale Werte — und die wenigen Fälle, in denen eine Vermehrung auftritt, sind zu unklar, auch stehen ihnen einige Fälle mit gleicher Diagnose und ausgesprochener Erniedrigung gegenüber — als daß man diagnostische oder gar prognostische Schlüsse ziehen könnte.

Und bei den vorliegenden über 200 Ergebnissen ist ja nur 2 mal eine Erhöhung auf 8192 bei dem 37. Fall und bei dem 38. Fall mit akuter Pankreasnekrose gefunden worden. Einmal bei sicherem Pankreaskopftumor finden sich an 2 verschiedenen Tagen jeweils 64 E.

Dagegen ist eine Erhöhung auf 128 E. in 5 Fällen und darüber hinaus in weiteren 5 Fällen auf 1024 E. und selbst auf 8192 bei Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege beobachtet. Da diesen aber 31 normale Werte und 2 Erniedrigungen gegenüberstehen, muß ich es ablehnen, der Vermehrung eine diagnostische Bedeutung beizumessen.

Doch kommen diese Ergebnisse den Beobachtungen von Skoog⁹⁾ nahe — denn auch dieser denkt ja bei einer deutlichen Diaftasevermehrung, wobei für ihn erst 512 E. sicher pathologisch sind, in erster Linie an das Pankreas oder an die Gallenblase. Und da Gallenleiden wesentlich häufiger sind als die akute Pankreatitis, erklärt sich daraus das obige Ergebnis.

IV. Eigene Bestimmungen.

Bei den verschiedensten Krankheiten, vor allem solchen infektiöser Genese, habe ich bei 43 Patienten den Diaftasewert bestimmt, und zwar vorwiegend im Harn, weil das für die Patienten schonender war als eine Blutentnahme. Das Ergebnis ist in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

Die Tabelle zeigt, daß 31 Werte völlig normal sind, wobei als „normal“ die bisherigen Werte von 8—64 E. angenommen werden — daß eine Vermehrung sich nur in 1 Fall (Nr. 43) feststellen läßt. Diese Patientin litt an offener Lungentuberkulose mit haematogener Ausfaat, sie hatte hohes Fieber bis zu 40,2°.

Die Sektion bestätigte die Diagnose auf Miliartuberkulose. Es finden sich viele miliare tuberkulöse Herde in den verschiedensten Organen, vor allem in Leber, Milz und Niere. Die peripankreatischen Lymphknoten zeigen eine frische Tuberkulose — es kann wohl angenommen werden, daß auch das Pankreas in Mitleidenschaft gezogen ist. Doch dürfte der Diaftasewert von 128 E. nicht hierin, sondern eher in dem hohen Fieber seinen Grund haben, gemäß der Anschauung von Germer¹⁸⁾ und Grumke⁶⁰⁾.

An der oberen Grenze — 64 E. im Harn, 32 E. im Blut — liegen 4 Werte.

Bei dem Patienten Nr. 42 liegt kein Grund für den Wert von 64 E. vor, bei der Kontrolle ist der Wert ja auch wieder zur Norm abgeklungen. Er steht aber in einem Gegensatz zu von Straffer¹⁰⁾.

Nr		Tag	Wert	Diagnose
1	K.	14. 5. 36	H.32	Pneumonie
		19. 5. 36	H.32	
2	M.	23. 6. 36	H.32	Diphtherie
3	B.	19. 6. 36	H.32	Chronische Nephritis
4	K.	25. 2. 36	H.16	Chron. Nephritis, Superacidität
5	B.	25. 6. 36	S. 16	Nierenstein
		26. 6. 36	H.16	
6	H.	23. 6. 36	S. 16	Extraventrik. Tumor im Oberbauch,
		26. 6. 36	H.16	Verlegung zur Chirurgischen Klinik
7	Sch.	17. 3. 36	H.16	Ca. des Magens oder der Pankreas
8	Sche.	30. 6. 36	H.32	Endocarditis (lental)?
9	St.	1. 4. 36	S. 8	Angina bei Thyreotoxikose
			H.32	
10	T.	4. 4. 36	S. 16	Scharlach
11	H.	4. 4. 36	H.32	Scharlach
		6. 4. 36	S. 8	
12	Kü.	1. 7. 36	H.16	Scharlach
13	W.	23. 4. 36	S. 8	Thyreotoxikose
14	Fl.	19. 6. 36	H.32	Diabetes mellitus
		27. 6. 36	H.16	
15	A.	27. 6. 36	H.16	Diabetes mellitus
16	Eb.	27. 6. 36	H.16	Diabetes mellitus
17	Fe.	27. 6. 36	H.16	Diabetes mellitus
18	Ste.	4. 4. 36	H.16	Gastritis, Ulcus ventr.
19	Re.	8. 7. 36	H.32	chron. Gastritis
		9. 7. 36	S. 16	
20	Ke.	17. 3. 36	H.32	Cholangitis
21	Wi.	4. 7. 36	H.32	Lungentuberkulose
22	Keu.	4. 7. 36	H.16	Lungentuberkulose
23	Gr.	4. 7. 36	H.32	Lungentuberkulose
24	Se.	4. 7. 36	H.32	Lungentuberkulose
25	Ba.	4. 7. 36	H.16	Lungentuberkulose
26	Bu.	6. 7. 36	H.16	Lungentuberkulose
27	Ne.	6. 7. 36	H.16	Lungentuberkulose

Nr.		Tag	Wert	Diagnose
28	Schn.	24. 6. 36	S. 8 H.16	Diabetes mellitus extraventr. Tumor
29	Schne.	4. 4. 36	S. 16	Leberlues
30	Ge.	20. 3. 36	S. 16	Gastritis, Bronchiektasen oder Lungenabszeß
31	Ley.	21. 3. 36	S. 16	Lungenabszeß
32	Pr.	7. 7. 36	H.8	Lungentuberkulose
33	Mey.	8. 7. 36 10. 7. 36	H.8 H.8	Ulcus ventriculi
34	Li.		H.8	Asthenie, fragl. Leberschädigung
35	Kl.	23. 6. 36 26. 6. 36	S. 8 H.8	Magen-Darmneurose
36	Le.	6. 7. 36 8. 7. 36 10. 7. 36 9. 7. 36	H.8 H.16 H.16 H.64	Masern
37	And.	8. 7. 36 10. 7. 36	H.4 H.8	Gastritis, Ulcus ventriculi
38	Pi.	30. 6. 36 1. 7. 36	H.4 H.8	Neoplasma der Lunge kachektischer Zustand
39	Lo.	9. 7. 36	H.64	Vergiftung, hohes Fieber
40	Un.	25. 6. 36	S. 32	Bronchial Ca., mit Metastasen in Leber, Milz, Pankreas
41	Bo.	14. 5. 36	H.64	Meningitis, hohes Fieber, geheilt
42	Sie.	4. 7. 36 6. 7. 36	H.64 H.32	Lungentuberkulose
43	Krä.	30. 6. 36 4. 7. 36 6. 7. 36	H.128 H.128 H.128	Offene Lungentuberkulose haematogene Aussaat, hohes Fieber

Durch das hohe Fieber lassen sich die Fälle Nr. 39 und Nr. 41 erklären, ebenso wie der vorhin erwähnte Fall Nr. 43 mit 128 E., wenn man sich der Ansicht von Thomfen²⁶⁾, Germer⁵⁸⁾, Garry⁵⁹⁾ und Grumke⁶⁰⁾ anschließen will.

Bei dem Patienten Nr. 40 erklärt sich die Erhöhung auf die obere Norm durch die bei der Sektion gefundenen Karzinom-

metastasen im Pankreas. Dieser Fall steht der Beobachtung von Graßberger²⁰⁾ gegenüber, der bei langfamer Entwicklung einer Schädigung keine vermehrte Diastaseauscheidung findet. Und auch für Skoog⁹⁾ ist die rasche Entwicklung einer Schädigung für eine erhöhte Diastaseurie von Bedeutung, daselbe fordern Felsenreich²¹⁾, Heiberg²⁾ und andere Autoren. Man kann aber auch annehmen, daß hier die Metastasen erst seit kurzer Zeit ins Pankreas eingedrungen sind, daß es sich also um eine subakute Schädigung handelt, in welchen Fällen viele Unterfucher eine leichte Erhöhung der Diastase finden, so Janker¹¹⁾, Popper²⁴⁾.

Zwischen diesen Ergebnissen und den Werten an der unteren Grenze steht der Fall Nr. 36, der anfangs den Harnwert von 8 E. aufweist, der bei der Kontrolle auf 64 E., also die obere Norm ansteigt und dann wieder zu normalen Werten zurückgeht. Dieser Anstieg steht nicht in Zusammenhang mit einer Verschlimmerung des Krankheitsbildes oder mit einer merklichen Temperatursteigerung.

Der niedrige Harnwert von 8 E. bei dem Patienten Nr. 35 ist wohl auf nervöse Einflüsse zurückzuführen, wie ja auch die Diagnose auf Magen-Darmneurose lautet, da sich für die von ihm angegebenen Beschwerden kein pathologischer Organbefund aufstellen läßt.

Ähnliches gilt wohl von dem Patienten Nr. 34, der an konstitutioneller Asthenie leidet. Die fragliche Leberschädigung stützt sich nur auf den etwas erhöhten Bilirubinblutwert und den Ausfall der Gelaktosaprobe.

Der Patient Nr. 32, der bei Lungentuberkulose einen Harnwert von 8 E. aufweist, befindet sich in ziemlich schlechtem Ernährungs- und Kräftezustand, von welcher Tatsache aus dieser Harnwert verstanden werden kann. Daselbe gilt für den Patienten Nr. 38, dessen Harnwerte von 4 bzw. 8 E. aus dem kachektischen Zustand des an einem Neoplasma der Lunge leidenden Patienten sich ableiten lassen, wenn man mit Baló und Laszlo⁶²⁾ gehen will. Dagegen fehlt für den Patienten Nr. 33 ein positiver Anhalt für den zweimaligen Harnwert von 8 E., wenn man nicht nervöse

Einflüsse heranziehen will. Daselbe gilt für den Patienten Nr. 37, der einen Harnwert von 4 bzw. 8 E. aufweist, und der an einer Gastritis sowie an Magengeschwür leidet. Nach den Angaben von Lindemann⁴⁷⁾ hätte man eher eine Erhöhung erwarten können.

Betreffend der tuberkulösen Erkrankungen muß ich also die Beobachtungen v. Straffer's¹⁰⁾ ablehnen — die Erniedrigung auf die untere Grenze der Norm von 8 E. habe ich nur in einem einzigen Falle feststellen können, und bei diesem glaube ich noch eher an das Darniederliegen aller Funktionen infolge des schlechten Zustandes des Patienten, und mit Baló und László⁶²⁾ einig gehen zu können.

Die Ergebnisse von Thomfen²⁶⁾, vor allem aber von Germer³⁸⁾, Garry³⁹⁾ und Grumke⁶⁰⁾ kann ich insofern bestätigen, als ich bei hohem Fieber den oberen Grenzwert und einmal sogar eine deutliche Vermehrung gefunden habe. Das trifft allerdings nicht für die Scharlachkranken zu, was einen Gegensatz zu den genannten Autoren bildet. Ebenfalls fand ich keine Erhöhung bei dem Patienten Nr. 1 mit Pneumonie.

In Bezug auf die Kranken mit Diabetes mellitus schließe ich mich der Ansicht v. Straffer's¹⁰⁾ an, da auch ich normale Werte gefunden habe. Die von de Tullio³³⁾, Meyers⁴⁰⁾ und Fuchs⁴¹⁾ gefundene Erhöhung und die von Wohlgemuth¹⁾ beobachtete Erniedrigung im Harn kann ich nicht bestätigen.

Auch bei den 3 Patienten mit Nierenleiden liegen die Werte im Bereiche des Normalen. Sie bilden also einen Gegensatz zu Wohlgemuth¹⁾, Schaanning⁶⁾, Schmerel³⁶⁾, Marino³⁷⁾, Noguchi³⁸⁾, Mellinghoff³⁹⁾. Man kann aber daran denken, da es sich um mehr chronische Leiden handelt, daß die Niere sich an den veränderten Zustand gewöhnt hat, woraus der normale Harndiastafewert sich erklären läßt, zumal die in einem Falle im Serum vorgenommene Bestimmung einen normalen Wert ergibt.

V. Allgemeine Zusammenfassung.

1. Der bisherige „obere Grenzwert der Norm“ muß als zu niedrig angesehen werden. Die obere Grenze muß mindestens bei 128 E. liegen. Eine solche leichte Vermehrung auf den neuen „oberen Grenzwert“ von 128 E. befagt noch garnichts in diagnostischer Hinsicht. Denn sie wird bei sehr vielen Erkrankungen gefunden, sogar bei Erkrankungen von Organen, die weit weg von der Bauchspeicheldrüse liegen, die mit ihr weder anatomisch noch funktionell etwas zu tun haben.
2. Der Blutwert zeigt ein viel gleichmäßigeres Verhalten; Schwankungen kommen seltener vor und nicht in dem Maße wie beim Harnwert. Die angegebenen Werte von 8—32 E. können als „normal“ betrachtet werden. 64 E. kann man als leicht, 128 E. als deutlich erhöht ansehen.
3. Finden sich im Harn Werte von 1024 E. und darüber, dann spricht das in erster Linie für eine akute Affektion des Pankreas oder der Gallenblase bzw. der Gallenwege. Das sonstige klinische Bild muß den Ausschlag geben, wobei jedoch zu beachten ist, daß beide Organe sehr häufig zusammen erkrankt sind, daß eine Erkrankung des einen leicht eine solche des andern zur Folge haben kann. Weiterhin muß gefordert werden, daß die Diastasebestimmung in den ersten 2—3 Tagen nach Krankheitsbeginn vorgenommen wird, weil der erhöhte Wert schnell wieder zur Norm abklingt.
4. Der Diastasewert allein kann auch hier den Ausschlag für die Stellung der Diagnose nicht geben, vielmehr muß das ganze klinische Bild berücksichtigt werden. Denn es kommen, wenngleich selten, Diastasewerte von 1024 E. und mehr vor, ohne daß eine faßbare Erkrankung des Pankreas oder des Gallensystems vorliegt.
5. Die Höhe der Diastasevermehrung läßt keinen Schluß auf die Schwere der Erkrankung zu. Wenngleich es von einigen Autoren behauptet wird, geht ein Absinken des erhöhten Wertes

durchaus nicht immer einer Besserung parallel, vielmehr kann dies Abklingen in den allermeisten Fällen beobachtet werden. Weiterhin ist ein solcher Rückgang der Diastase gerade in schwersten Fällen oft ein ungünstiges Zeichen — der Rückgang geht dann mit einer ausgesprochenen Verschlimmerung des Krankheitsbildes einher.

6. Werte von 256 E. und 512 E. finden sich häufig bei allen möglichen Krankheiten, ohne daß aus dieser Tatsache jedoch ein diagnostischer oder ein prognostischer Schluß gezogen werden könnte. Auch hier kommt es in erster Linie auf das sonstige klinische Bild an. Immer muß bei solchen Werten berücksichtigt werden, welche Zeit seit dem Auftreten der ersten alarmierenden Symptome vergangen ist — denn es ist leicht möglich, daß nach einer anfänglich beträchtlichen Vermehrung der Diastasewert schon wieder im Abklingen begriffen ist, während das schwere Krankheitsbild noch weiter besteht.
7. Bei Erkrankungen von Organen in der Nähe der Bauchspeicheldrüse kann ein Ansteigen des vorher normalen Wertes für die Diagnose einer begleitenden leichten Pankreatitis herangezogen werden.
8. Bei einem akuten Bauchzustand, der die klinischen Symptome einer akuten Pankreasnekrose bietet, soll ein normaler Diastasewert nicht von dem Stellen dieser Diagnose oder gar von einer evtl. Operation abhalten, da normale Diastasewerte selbst eine akute Pankreaserkrankung nicht ganz sicher ausschließen. Vor allem aber gehen subakute und chronische Pankreatiten in den allermeisten Fällen mit normalen Werten einher. Wenn sonstige klinische Zeichen einer chronischen Pankreatitis bestehen, dann kann selbst bei normalem Diastasewert die Diagnose mit Sicherheit gestellt werden.
9. Bei Patienten, die sich in ausgesprochen kachektischem Zustand befinden, liegt der Diastasewert meist an der untern normalen Grenze, oft ergibt sich sogar eine Verminderung. Jedoch können aus einem solchen Befund keine diagnostischen oder prognostischen Schlüsse gezogen werden.

10. Eine merkbare Abhängigkeit des Diaftafewertes von allen möglichen andern Faktoren, wie z. B. Ernährung, Temperatur, rotes oder weißes Blutbild, Zucker- und Bilirubinspiegel, Rest-N, NaCl-Konzentration usw., ist nicht festzustellen.
 11. Der Diaftasebestimmung kann daher nicht die große Bedeutung zugesprochen werden, die sie anfangs genoß, denn gar zu oft finden sich Abweichungen und erlebt man Enttäuschungen. Nur bei genauer Berücksichtigung aller andern klinischen Untersuchungen und des Zeitpunktes der Bestimmung ist sie wertvoll, um die Diagnose zu kräftigen und zu stützen, evtl. zu ergänzen — nicht aber, um sie auszuschließen.
-

Zum Schlusse möchte ich nicht unterlassen, Herrn Professor Dr. Martini für die lebenswürdige Angabe des Themas, sowie ihm und Herrn Professor Dr. v. Redwitz für die Überlassung des Materials zu danken. Desgleichen spreche ich Herrn Dr. Schuler für die freundliche Beratung meinen Dank aus.

Literatur.

1. Wohlgemuth: Biochem. Z.-Schrift 1908.
 — Biochem. Z.-Schrift 1909.
 — Berl. Klin. Wo. 1910; S. 92.
2. Heiberg: Die Krankheiten des Pankreas, Bln. 1914.
3. Somogyi: Z.Bl. (Kongreß-Zentral-Blatt für die gefamte innere Medizin) 69; S. 701 (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 29; S. 1126).
4. Chesley: Journ. of biol. Chem. 42, S. 171.
5. Reid: Brit. Journ. exp. Pathol. 6; S. 314 (zit. Z.Bl. 43, S. 454).
6. Schaanning: Norsk Mag. Laeg. 88, S. 801 (zit. Z.Bl. 49, S. 651).
7. Noeby: Ugekr. Laeg. 1930, S. 40 (zit. Z.Bl. 59, S. 838).
8. Baumann: Der Chirurg 3, S. 376.
9. Skoog: Acta chir. scand. 63, S. 374.
 — Acta chir. scand. 65, Suppl. 14.
 — Der Chirurg 1, S. 305.
10. v. Straffer: Dt. Arch. klin. Med. 151, S. 110.
11. Janker: Mü. Med. Wo. 74, S. 101 (1927).
12. Roloff: Dt. Med. Wo. 1927, S. 1043.
13. Oesterberg: Svenska Läkart. 24, S. 914 (zit. Z.Bl. 48, S. 222).
14. Krech: Bruns Beitr. 153, S. 110.
15. Cohn: Arch. Verd. Krankh. 39, S. 199.
16. Wildegans: D. Chir. 1, S. 343.
17. Elman: Proc. soc. exp. Biol. a. Med. 25, S. 173 (zit. Z.Bl. 51, S. 323).
18. Douglas: Amer. Journ. Digest. Bis. a. Nutr. 1, S. 871 (zit. Z.Bl. 80, S. 314).
19. Mikkelsen: Hosp. Stid. 70, S. 1095 (zit. Z.Bl. 50, S. 849).
20. Grassberger: Dt. Ztschr. Chir. 210, S. 293.
21. Lafch: Z.Bl. Chir. 1927, S. 924.
22. Nordmann: Med. Klin. 1934, S. 1516.
23. Rost: Mü. Med. Wo. 1933, S. 197.
24. Popper: Dtsch. Med. Wo. 1929, S. 1712.
25. Rostok: Bruns Beitr. 143, S. 330.
26. Thomfen: Ugeskr. Laeg. 1929, S. 1045 (zit. Z.B. 56. S. 785).

27. Ringdall: Norsk. Mag. Laeg. 91, S. 1317 (zit. Z.Bl. 61, S. 32).
28. Kaczander: Dt. Med. Wo. 1931, S. 1103.
29. Foged: Hop. Tid. 1932, S. 1359 (zit. Z.Bl. 69, S. 468), desgl. 1931, S. 991, Act. chir. scand. 69; S. 451; S. 543.
30. Niffen: Dt. Med. Wo. 1933, S. 1464.
31. Schorlemmer: Arch. Verd. Krankh. 43, S. 366.
32. v. Redwitz: Mü. Med. Wo. 1924, S. 1561.
33. de Tullio: Fol. med. Napoli 14, S. 1765 (zit. Z.Bl. 54, S. 726).
34. Vogel: Dt. Ztschr. Chir. 185, S. 71.
35. Pinna: Fol. med. 14, S. 270 (zit. Z.Bl. 50, S. 222).
36. Schmerel: Bioch. Ztschr. 208, S. 415.
37. Marino: Arch. Klin. Med. 103.
38. Noguchi: Arch. Klin. Chir. 98.
39. Mellinshoff: Dt. Med. Wo. 1934, S. 1127.
40. Meyers: Journ. Biol. Chem. 29 (zit. nach Schmerel).
41. Fuchs: Bioch.-Zschr. 136, S. 469.
42. Ghedini: Chir. Med. Ital. 51, S. 146 (zit. nach Schmerel).
43. Bettoni: Arch. Pat. e. Clin. Med. 10, S. 615 (zit. Z.Bl. 65, S. 411).
44. Lopper: Wien. Klin. Wo. 41, S. 199.
45. Rofeno: Dt. Med. Wo. 54, S. 783.
46. Wakefield: Arch. int. Med. 45, S. 473 (zit. Z.Bl. 57, S. 736).
47. Lindemann: Zschr. Klin. Med. 75, S. 58.
48. Hegge: Norsk. Mag. Laeg. 91, S. 221 (zit. Z.Bl. 57, S. 735).
49. Cassano: Rass. Ter. e. Pat. Clin. 2, S. 325 (zit. Z.B. 60, S. 439).
50. Grandall: Arch. of Neur. 27, S. 367 (zit. Z.B. 66, S. 824).
51. Sotgiu: Probl. aliment. 2, S. 5 (zit. Z.Bl. 70, S. 768).
52. Hirschhorn: Klin. Wo. 1931, S. 493).
53. Block: Arch. Klin. Chir. 118, S. 114.
54. Koch: Dt. Zschr. Chir. 232, S. 414.
55. Adam: Klin. Wo. 1923, S. 1548.
56. Dodds: Brit. med. Journ. I, IV (zit. nach Adam).
57. Renke: Ztschr. exp. Med. 76, S. 308.
58. Germer: Bibl. Laeg. 123, S. 405 (zit. ZBl. 67, S. 651).
59. Garry: Arch. f. klin. Chir. 176, S. 378.
60. Grumke: Z. Schr. f. klin. Med. 113, S. 782.
61. v. Falkenhausen: Naunyn-Schmiedeb. Arch. 139, S. 14.
62. Balou. Laszlo: Magy. orv. Arch. 34; S. 179.
63. Tinozzi: Z. Schr. Krebsforsch. 37, S. 462.

Lebenslauf.

Als Sohn des Kaufmanns Theodor Hummel und seiner Ehefrau Maria, geb. Schmidtkunz, wurde ich, Hermann Hummel, am 18. Januar 1912 zu Kassel geboren. Von 1918 bis 1922 besuchte ich die Volksschule dortselbst und später die Oberrealschule II, an welcher ich 1931 zu Ostern die Reifeprüfung bestand.

Im Anschluß begann ich das Medizinstudium in Marburg (Lahn), setzte es in Bonn fort, wo ich im Sommer-Semester 1933 die Vorprüfung bestand.

Die folgenden klinischen Semester verbrachte ich ebenfalls in Bonn. In den Ferien famulierte ich an der Chirurg. und der Mediz. Klinik, sowie der Chirurg. Poliklinik und der Hals-Nase-Ohren-Poliklinik in Bonn und am Landeskrankenhaus in Kassel.

Das ärztliche Staatsexamen bestand ich am 26. Januar 1937 ebenfalls in Bonn.

